

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040032 Назва сорту: Даззлер Заявник (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 04.09.2023 Патент № 230450

Дата пріоритету: 20.05.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
3	Сім'ядолі: за шириною	середні	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	середня	5	
11	Рослина: час початку цвітіння	ранній	3	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	висока	7	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	короткий	3	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,15	3,46	4,52
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,55	-0,01	1,65
+, - до усередненої урожайності, %	21,2	-0,3	57,5
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, днів	294	313	309
Висота рослини, см	130	134,4	133,6
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	3,9	4,7	5
Вміст білка, %	19,1	17,2	17,3
Вміст олії, %	47,8	49,1	49,3
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	7	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	7	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	6	8
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	6	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	6	6
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	6	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.