

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus* L. *oleifera*

Заявка № 21040033 Назва сорту: ІНВ 2020 Заявник (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 Патент № 230451

Дата пріоритету: 20.05.2021

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядолі: за довжиною	короткі	3	
3	Сім'ядолі: за шириною	вузькі	3	
4	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
5	Листок: частки	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	середня	5	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	короткий	3	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка	коротка	3	
11	Рослина: час початку цвітіння	середній	5	
12	Квітка: забарвлення пелюсток	жовте	3	
13	Квітка: пелюстки за довжиною	середні	5	
14	Квітка: пелюстки за шириною	середні	5	
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	
17	Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)	середня	5	
18	Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)	середній	5	
19	Стручок: носик за довжиною	середній	5	
20	Стручок: плодоніжка за довжиною	середня	5	
21	Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби	відсутня або дуже слабка	1	
22	Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,60	3,47	2,87
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га	3,20	3,87	4,38
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,60	0,40	1,51
+, - до усередненої урожайності, %	23,1	11,5	52,6
Довірчий інтервал, т/га	0,06	0,05	0,05
Тривалість періоду вегетації, днів	295	313	308
Висота рослини, см	137	137	133,4
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г	4,3	5,1	4,9
Вміст білка, %	19,2	17,2	17,1
Вміст олії, %	48,1	49,1	49,6
Вміст ерукової кислоти, %	0	0	0
Вміст глюкозинолатів, %	0,7	0,6	0,7
Стійкість до вилягання, бал	8	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	7	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Зимостійкість: польова оцінка, бал	9	7	9
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал	7	8	7
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал	8	7	4
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	7	8
Блок	1	1	1
Напрямок використання	олн	олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.