

Вид: Ріпак (озимий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21040028 Назва сорту: Кондор Заявник (код): 807

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.09.2023 Патент № 230446

Дата пріоритету: 18.05.2021

## Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка |
|----|---|--------------------------|-----|----------|
| 1  | Насіння: ерукова кислота                                    | відсутня                 | 1   |          |
| 2  | Сім'ядолі: за довжиною                                      | середні                  | 5   |          |
| 3  | Сім'ядолі: за шириною                                       | середні                  | 5   |          |
| 4  | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення                  | помірна                  | 5   |          |
| 5  | Листок: частки  | наявні                   | 9   |          |
| 6  | Листок: кількість часток (повний розвиток листка)           | середня                  | 5   |          |
| 7  | Листок: зубчастість краю                                    | помірна                  | 5   |          |
| 8  | Листок: за довжиною (пластинка і черешок)                   | середній                 | 5   |          |
| 9  | Листок: за шириною (у найширшому місці)                     | середній                 | 5   |          |
| 10 | Лише сорти з часточковими листками. Листок: довжина черешка | середня                  | 5   |          |
| 11 | Рослина: час початку цвітіння                               | середній                 | 5   |          |
| 12 | Квітка: забарвлення пелюсток                                | жовте                    | 3   |          |
| 13 | Квітка: пелюстки за довжиною                                | середні                  | 5   |          |
| 14 | Квітка: пелюстки за шириною                                 | середні                  | 5   |          |
| 15 | Рослина: утворення пилку                                    | наявне                   | 9   |          |
| 16 | Рослина: за висотою (за повного цвітіння)                   | середня                  | 5   |          |
| 17 | Рослина: загальна довжина (включно з бічними пагонами)      | середня                  | 5   |          |
| 18 | Стручок: за довжиною (між плодоніжкою та носиком)           | середній                 | 5   |          |
| 19 | Стручок: носик за довжиною                                  | середній                 | 5   |          |
| 20 | Стручок: плодоніжка за довжиною                             | довга                    | 7   |          |
| 21 | Тенденція формування суцвіть в рік весняної сівби           | відсутня або дуже слабка | 1   |          |
| 22 | Тенденція формування суцвіть в рік пізньо-літньої сівби     | ознака не визначається   | 0   |          |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |       |       |
|---|----------|-------|-------|
|   | С        | Л     | П     |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 2,60     | 3,47  | 2,87  |
| Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га  | 3,00     | 3,53  | 3,96  |
| +, - до усередненої урожайності, т/га   | 0,40     | 0,06  | 1,09  |
| +, - до усередненої урожайності, %  | 15,4     | 1,7   | 38,0  |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,06     | 0,05  | 0,05  |
| Тривалість періоду вегетації, днів  | 295      | 313   | 309   |
| Висота рослини, см  | 135,5    | 137,4 | 139,5 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г   | 4,3      | 5,2   | 5,1   |
| Вміст білка, %  | 18       | 15,2  | 15,8  |
| Вміст олії, %   | 48,6     | 50,8  | 50,5  |
| Вміст ерукової кислоти, %   | 0        | 0     | 0     |
| Вміст глюкозинолатів, %   | 0,7      | 0,8   | 0,8   |
| Стійкість до вилягання, бал   | 6        | 8     | 9     |
| Стійкість до обсіпання, бал   | 7        | 7     | 8     |
| Стійкість до посухи, бал  | 6        | 8     | 9     |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал  | 9        | 8     | 9     |
| Стійкість проти пильщика ріпакового, бал  | 7        | 8     | 7     |
| Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал   | 7        | 7     | 4     |
| Стійкість проти бактеріозу, бал   | 9        | 9     | 7     |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал  | 8        | 7     | 9     |
| Блок  | 1        | 1     | 1     |
| Напрямок використання   | олн      | олн   | олн   |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.