

Вид: Горох посівний (овочевий) *Pisum sativum* L.**Заявка №** 20095004 **Назва сорту:** ЕЛЬДОРАДО **Заявник (код):** 2644 **Власник сорту (код):** 1959**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 27.09.2023 **Патент №** 230479**Дата пріоритету:** 17.12.2020**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 25.09.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230681**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Стебло: антоціанове забарвлення пазухи	відсутнє	1	
3	Стебло: фасціація	відсутня	1	
4	Стебло: за довжиною	середнє	5	
5	Стебло: кількість вузлів (перший fertильний вузол включно)	середня	5	
6	Листя: забарвлення	зелене	2	
7	Лише сорти з зеленим забарвленням листків: (озн. 6: стан 2). Листки: інтенсивність забарвлення	помірна	5	
8	Листок: листочки	наявні	9	
9	Листок: максимальна кількість листочків	середня	5	
10	Листочек: розмір	середній	5	
11	Листочек: за довжиною	середній	5	
12	Листочек: за ширину	середній	5	
13	Листочек: положення найширишої частини	біля основи	3	
14	Листочек: зубчастість	відсутня або дуже слабка	1	
15	Прилисток: за довжиною	короткий	3	
16	Прилисток: за ширину	середній	5	
17	Прилисток: розмір	середній	5	
18	Прилисток: відстань від пазухи до верхівки	середня	5	
19	Прилисток: частина нижче пазухи за довжиною	коротка	3	
20	Прилисток: плямистість	наявна	9	
21	Прилисток: щільність плямистості	помірна	5	
22	Черешок: за довжиною від пазухи до першого листочка чи вусика	середній	5	
23	Лише сорти без листочків. Черешок: за довжиною від пазухи до останнього вусика	ознака не визначається	0	
24	Рослина: час цвітіння	ранній	3	
25	Лише сорти без фасціації стебла. Рослина: максимальна кількість квіток на вузлі	дві	3	
26	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Квітка: забарвлення крил (весел)	ознака не визначається	0	
27	Лише сорти без антоціанового забарвлення. Квітка: забарвлення паруса	бліле	1	
28	Квітка: парус за ширину	вузький	3	
29	Квітка: форма основи паруса	піднесена	3	
30	Квітка: хвильястість паруса	відсутня або дуже слабка	1	
31	Квітка: чашолисток за ширину	вузький	3	
32	Квітка: форма верхівки верхнього чашолистка	загострена	1	
33	Квітконос: верхівка (шпора) за довжиною	коротка	3	
34	Квітконос: відстань від стебла до першого бобу	середня	5	
35	Квітконос: відстань між першим і другим бобом	середня	5	
36	Квітконос: кількість приквітків	відсутні або мала	1	
37	Біб: за довжиною	середній	5	
38	Біб: за ширину	середній	5	
39	Біб: пергаментний шар	суцільній	2	
40	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: потовщення стулок	ознака не визначається	0	
41	Лише сорти без потовщення стулок. Біб: форма дистального кінця	тупа	2	
42	Біб: вигин	слабкий	3	
43	Біб: забарвлення	зелене	2	
44	Лише сорти з зеленим забарвленням бобу (оз. 43: стан 2). Біб: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
45	За винятком сортів з пергаментним шаром. Біб: волокна шва	ознака не визначається	0	
46	Біб: кількість настінцевих зачатків	середня	5	
47	Нестиле: настіння: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
48	Насініна: форма	циліндрична	2	
49	Насініна: тип крохмальних зерен	складний	2	
50	Лише сорти з циліндричною формою насінини і простим типом крохмальних зерен. Насініна: зморшкуватість сім'ядолей	ознака не визначається	0	
51	Лише сорти з насінінами із складним типом крохмальних зерен. Насініна: інтенсивність зморшкуватості сім'ядолей	помірна	5	
52	Насініна: забарвлення сім'ядолей	зелене	1	
53	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: мармуровість насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
54	Лише сорти з антоціановим забарвленням. Насініна: фіолетові чи рожеві плями на насіннєвій шкірці	ознака не визначається	0	
55	Насініна: забарвлення рубчика	не відрізняється від насіннєвої шкірки	1	
56	Лише сорти з антоціановим забарвленням: Насініна: забарвлення насіннєвої шкірки	ознака не визначається	0	
57	Насіння: маса	середня	5	
58	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>pisi</i>	наявна	9	
59	Стійкість проти <i>Erysiphe pisi</i> Syd.	наявна	9	
60	Стійкість проти <i>Ascochyta pisi</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти <i>Erysiphe communis</i> Syd.	наявна	9	
62	Тип розвитку	ярий	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Напрям використання: 1 – лущильний (зелений горошок). Загальна врожайність лопаток / зеленого горошку, т/га – 7,1. Урожайність ранньої продукції, т/га – 7,1. Маса 1000 насінин, г – 190.Період від повних сходів до початку технічної (споживчої) стигlosti, дiб – 60. Тривалість плодоношення, дiб – 75. Дегустацiйна оцiнка лопаток / зеленого горошку, бал (1–9) – 8. Вмiст сухої речовини в зеленому горошку, % – 15; загального цукру, % – 6; бiлка, % – 20. Якiсть бобiв: боби з пергаментом, % – 100. Стiйкiсть проти збудникiв хвороб, бал (1–9): аскохiтоz (*Ascochyta pisii* LibeRt) – 7; кореневi гнилi (*Pythium de Baryanum* Hesse, *Botrytis cinerea* Pers., *Hypochnus solani* Prill. et Del.) – 8. Стiйкiсть proti шкiдникiв, бал (1–9): горохова зернiвка (брuchus) (*Bruchus pisorum* L.) – 8.

Географiчнi та зоновi рекомендацiї використання сорту: СЛП.