

**Вид:** Пшениця м'яка (озима) *Triticum aestivum* L.

**Заявка № 21012030 Назва сорту:** Атрибут **Заявник (код):** 807 **Власник сорту (код):** 807

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент №** 230583

**Дата пріоритету:** 18.05.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 230789

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення               | Код | Примітка    |
|----|---|--------------------------|-----|-------------|
| 1  | Колеоптиль: інтенсивність антоціанового забарвлення                   | відсутня або дуже слабка | 1   | до слабкої  |
| 2  | Рослина: габітус (форма куща)   | напівпрямий              | 3   |             |
| 3  | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок                     | відсутнє або дуже слабе  | 1   |             |
| 4  | Кількість рослин із зігнутим прапорцевим листком                      | відсутня або дуже мала   | 1   |             |
| 5  | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів)           | середній                 | 5   |             |
| 6  | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві                           | сильний                  | 7   |             |
| 7  | Колос: восковий наліт   | сильний                  | 7   |             |
| 8  | Соломина: восковий наліт на верхньому міжвузлі                        | помірний                 | 5   |             |
| 9  | Рослина: за висотою (стебло і колос)                                  | середня                  | 5   |             |
| 10 | Соломина: виповнення (переріз між основою колосу й найближчим вузлом) | слабко виповнена         | 3   |             |
| 11 | Колос: форма (вигляд збоку)   | пірамідальна             | 1   |             |
| 12 | Колос: за щільністю   | середній                 | 5   |             |
| 13 | Колос: за довжиною (без остюків і зубців)                             | довгий                   | 7   |             |
| 14 | Колос: остюки або зубці нижніх квіткових лусок                        | наявні зубці             | 2   |             |
| 15 | Колос: зубці / остюки на верхівці за довжиною                         | дуже короткі             | 1   |             |
| 16 | Колос: забарвлення  | біле або солом'яно-жовте | 1   |             |
| 17 | Соломина: опушення опуклої поверхні верхнього вузла                   | відсутнє або дуже слабе  | 1   |             |
| 18 | Нижня колоскова луска. Плече: за шириною (колосок у середині колоса)  | широке                   | 7   |             |
| 19 | Нижня колоскова луска. Плече: за формою                               | пряме                    | 3   |             |
| 20 | Нижня колоскова луска. Зубець: за довжиною                            | дуже короткий            | 1   |             |
| 21 | Нижня колоскова луска. Зубець: за формою                              | прямий                   | 1   |             |
| 22 | Нижня колоскова луска: опушення внутрішньої поверхні                  | слабке                   | 3   |             |
| 23 | Нижня квіткова луска. Зубець: за формою                               | ледь зігнутий            | 2   |             |
| 24 | Зернівка: забарвлення   | біле                     | 1   |             |
| 25 | Зернівка: забарвлення у фенолі  | відсутнє або дуже світле | 1   |             |
| 26 | Тип розвитку  | озимий                   | 1   |             |
| 27 | Зернівка: за довжиною   | середня                  | 5   |             |
| 28 | Зернівка: за шириною  | вузька                   | 3   |             |
| 29 | Зернівка: відношення довжина/ ширина                                  | середнє                  | 5   |             |
| 30 | Зернівка: за крупністю  | дрібна                   | 3   |             |
| 31 | Язичок: виявлення   | короткий                 | 3   |             |
| 32 | Нижня квіткова луска: кіль  | відсутній                | 1   |             |
| 33 | Вушка: за формою  | гострі                   | 2   |             |
| 34 | Нижня колоскова луска: опушення зовнішньої поверхні                   | слабке                   | 3   |             |
| 35 | Нижня колоскова луска: форма (колосок із середньої третини колоса)    | овально-ланцетна         | 3   |             |
| 36 | Прапорцевий листок: восковий наліт листкової пластинки                | помірний                 | 5   | до сильного |
| 37 | Нижня колосова луска: опушення зовнішньої поверхні                    | наявне                   | 9   |             |

## Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник  | Значення |       |      |
|---|----------|-------|------|
|   | С        | Л     | П    |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 5,33     | 6,97  | 6,26 |
| Урожайність (за стандартної вологості 14%), т/га  | 7,70     | 8,50  | 8,52 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га   | 2,37     | 1,53  | 2,26 |
| +, - до усередненої урожайності, %  | 44,5     | 22,0  | 36,1 |
| Довірчий інтервал, т/га   | 0,07     | 0,05  | 0,04 |
| Тривалість періоду вегетації, діб   | 277      | 271   | 269  |
| Висота рослини, см  | 82,8     | 83,8  | 88,8 |
| Маса 1000 зерен (за стандартної вологості 14%), г   | 39,7     | 42,7  | 40,6 |
| Вміст білка, %  | 13,6     | 13,4  | 12,7 |
| Вміст сирової клейковини, %   | 29,3     | 26,2  | 26,2 |
| Показник альвеографа (W), о.а.  | 252,3    | 266,3 | 245  |
| Об'єм хліба зі 100 г борошна, мл  | 960      | 900   | 940  |
| Стійкість до вилягання, бал   | 9        | 8     | 9    |
| Стійкість до обсипання, бал   | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість до посухи, бал  | 8        | 8     | 8    |
| Стійкість проти борошнистої роси, бал   | 9        | 8     | 7    |
| Стійкість проти бурої іржі, бал   | 9        | 9     | 7    |
| Стійкість проти фузаріозу колоса, бал   | 9        | 9     | 8    |
| Стійкість проти мухи шведської, бал   | 8        | 9     | 9    |
| Стійкість проти клопа-черепашки, бал  | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість проти летючої сажки, бал  | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість проти твердої сажки, бал  | 9        | 9     | 9    |
| Стійкість проти твердої сажки за штучного зараження, бал                                      |          | 7     |      |
| Зимостійкість: польова оцінка, бал  | 8        | 7     | 8    |
| Морозостійкість за штучного проморожування, бал   |          | 9,0   |      |
| Блок  | 1        | 1     | 1    |
| Напрямок використання   | ф        | цїн   | ф    |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.