

Вид: Ячмінь звичайний (озимий) *Hordeum vulgare* L.

Заявка № 21019010 Назва сорту: Румкас **Заявник (код):** 2302 **Власник сорту (код):** 2302

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230560**

Дата пріоритету: 09.07.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.08.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230471

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|--------------------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: габітус (форма куща) | напівпрямий | 3 | |
| 2 | Нижні листки: опушення піхви | наявне | 9 | |
| 3 | Прапорцевий листок: антоціанове забарвлення вушок | відсутнє | 1 | |
| 4 | Прапорцевий листок: інтенсивність антоціанового забарвлення вушок | ознака не визначається | 0 | |
| 5 | Рослина: кількість рослин із похилим прапорцевим листком | мала | 3 | |
| 6 | Прапорцевий листок: восковий наліт на піхві | помірний | 5 | |
| 7 | Час початку колосіння (перший колосок видно на 50% колосів) | ранній | 3 | |
| 8 | Остюки: антоціанового забарвлення кінчиків | відсутнє | 1 | |
| 9 | Остюки: інтенсивність антоціанового забарвлення кінчиків | ознака не визначається | 0 | |
| 10 | Колос: восковий наліт | відсутній або дуже слабкий | 1 | |
| 11 | Колос: положення в просторі | пряме | 1 | |
| 12 | Рослина: за висотою (стебло, колос та остюки) | середня | 5 | |
| 13 | Колос: кількість рядів | шість | 2 | |
| 14 | Колос: форма | циліндрична | 5 | |
| 15 | Колос: за щільністю | середній | 5 | |
| 16 | Колос: за довжиною (з остюками) | середній | 2 | |
| 17 | Остюки: за довжиною (порівняно з колосом) | довгі | 7 | |
| 18 | Стрижень колосу: за довжиною першого сегменту | короткий | 3 | |
| 19 | Стрижень колоса: вигин першого сегмента | малий | 3 | |
| 20 | Стерильний колосок: положення (в середній третині колоса) | ознака не визначається | 0 | |
| 21 | Середній колосок: колоскові луски й остюки за довжиною відносно зернівки | довші | 3 | |
| 22 | Зернівка: волоски основної щетинки за довжиною | довгі | 2 | |
| 23 | Зернівка: плівчастість | наявна | 9 | |
| 24 | Зернівка: інтенсивність антоціанового забарвлення жилок зовнішньої квіткової луски | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 25 | Зернівка: зазублення внутрішніх бічних жилок нижньої квіткової луски | помірне | 5 | |
| 26 | Зернівка: опушення вентральної боріздки | відсутнє | 1 | |
| 27 | Зернівка: розташування лодикул | фронтальне | 1 | |
| 28 | Зернівка: забарвлення алеїронового шару | сильне забарвлення | 3 | |
| 29 | Тип розвитку | озимий | 1 | |
| 30 | Колос: остюки | наявні | 9 | |
| 31 | Вирости на зовнішній квітковій лусці: форма виявлення | остюки | 5 | |
| 32 | Зернівка: форма | видовжено-еліптична | 5 | |
| 33 | Зернівка: поверхня зовнішньої квіткової луски | грубозморшкувата | 9 | |
| 34 | Тільки для плівчастих сортів. Зернівка: опушення зовнішньої квіткової луски | наявне | 9 | |
| 35 | Зернівка: перехід від зовнішньої квіткової луски до остюка | широкий (біля основи остюка напливи) | 3 | |
| 36 | Вушка: форма верхівки | шилоподібна | 3 | |
| 37 | Вушка: охоплення соломини | перекриваюче | 3 | |
| 38 | Язичок: ступінь виявлення | сильний | 7 | |
| 39 | Соломина: виповнення (переріз між основою колоса й верхнім вузлом) | слабко виповнена | 3 | |
| 40 | Рослина: утворення пилку (чоловіча стерильність) | ознака не визначалась | 0 | |
| 41 | Рослина: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 42 | Колос: розвиток стерильних колосків (лише для дворядних сортів) | ознака не визначалась | 0 | |
| 43 | Квіткова луска: форма основи | не скошена | 1 | |