

Вид: Капуста білоголова *Brassica oleracea* L. var. *alba* DC.

Заявка № 21096006 Назва сорту: Сплеш болл **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 27.10.2023 **Патент №** 230623

Дата пріоритету: 03.08.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 19.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230854

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: за висотою	низька	3	
1,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
1,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: за висотою	ознака не визначається	0	
2,1	Лише для сортів капусти білоголової. Рослина: найбільший діаметр (разом із зовнішніми листками)	середній	5	
2,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Рослина: найбільший діаметр (як для 2,1)	ознака не визначається	0	
2,3	Лише для сортів капусти савойської. Рослина: найбільший діаметр (як для 2,1)	ознака не визначається	0	
3	Рослина: зовнішнє стебло за довжиною	коротке	3	до середнього
4	Рослина: положення зовнішніх листків	розлоге	5	
5,1	Лише для сортів капусти білоголової. Зовнішній листок: розмір	малий	3	
5,2	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
5,3	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір	ознака не визначається	0	
6	Зовнішній листок: форма пластиинки	округла	3	
7	Зовнішній листок: профіль верхньої частини пластиинки	увігнутий	1	
8,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	відсутній або дуже слабкий	1	
8,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: ступінь пухирчастості	ознака не визначається	0	
9,1	Лише для сортів капусти білоголової і червоноголової. Зовнішній листок: розмір пухирців	середній	5	
9,2	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: розмір пухирців	ознака не визначається	0	
10	Лише для сортів капусти савойської. Зовнішній листок: гофрованість	ознака не визначається	0	
11	Зовнішній листок: забарвлення (з восковим нальотом)	жовто-зелене	1	
12	Зовнішній листок: інтенсивність забарвлення	слабка	3	
13	Лише для сортів капусти червоноголової. Зовнішній листок: зеленкуватість	ознака не визначається	0	
14	Зовнішній листок: восковий наліт	слабкий	3	
15	Зовнішній листок: ступінь хвильастості краю	слабкий	3	
16	Зовнішній листок: вигин краю	відсутній	1	
17	Головка: форма поздовжнього розрізу	округла	3	
18	Головка: форма основи у поздовжньому розрізі	округла	1	
19	Головка: за довжиною	середня	5	
20	Головка: діаметр	малий	3	до середнього
21	Головка: розміщення найбільшого діаметра	посередині	2	
22	Головка: ступінь покриття	частково покритий	2	
23	Лише для сортів капусти савойської. Головка: пухирчастість покривного листка	ознака не визначається	0	
24	Головка: вигин краю покривного листка	наявний	9	
25	Головка: забарвлення покривного листка	жовто-зелене	1	
26	Головка: інтенсивність забарвлення покривного листка	слабка	3	до помірної
27	Лише сорти капусти білоголової і савойської. Головка: антоціанове забарвлення покривних листків	відсутнє або дуже слабке	1	
28	Головка: внутрішнє забарвлення	жовтувате	2	
29	Лише сорти капусти червоноголової. Головка: інтенсивність внутрішнього забарвлення	ознака не визначається	0	
30	Головка: за щільністю	нешільна	3	
31	Головка: внутрішня структура	середня	5	
32	Головка: довжина внутрішнього стебла відносно довжини головки	коротка	3	до середньої
33,1	Лише сорти капусти білоголової. Час збиравальної стигlosti	дуже ранній	1	до раннього
33,2	Лише сорти капусти червоноголової. Час збиравальної стигlosti	ознака не визначається	0	
33,3	Лише сорти капусти савойської. Час збиравальної стигlosti	ознака не визначається	0	
34	Час розтріскування головки після досягнання	ранній	3	
35	Чоловіча стерильність	наявна	9	
36	Стійкість до раси 1 <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>conglutinans</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Загальна врожайність, т/га – 65.Період від сівби до початку досягнання, діб – 95. Лежкість, балів (1–9) – 3. Вміст вітаміну С, мг % – 35; загального цукру, % – 5,5; сухої речовини, % – 8,7. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 7, бактеріоз судинний – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП, ЗГр.