

Вид: Капуста цвітна *Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Заявка № 21101004 Назва сорту: КЛЕМЕНТИН **Заявник (код):** 1050 **Власник сорту (код):** 1050

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 31.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230943

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотилля | наявне | 9 | |
| 2 | Рослина: за висотою (за збирання) | висока | 7 | |
| 3 | Стебло: за довжиною (до місця прикріплення першого листка) | довге | 7 | |
| 4 | Листок: положення | напівпряме | 3 | |
| 5 | Листок: за довжиною | довгий | 7 | |
| 6 | Листок: за шириною | широкий | 7 | |
| 7 | Листок: відношення ширина/довжина | середнє | 5 | |
| 8 | Листок: часточковість | відсутня | 1 | |
| 9 | Листок: забарвлення (з восковим нальотом, якщо є) | сіро-зелене | 2 | |
| 10 | Листок: інтенсивність забарвлення (як для 9) | помірна | 5 | |
| 11 | Листок: закручування верхівки | слабке | 3 | |
| 12 | Листок: форма поперечного перерізу | увігнута | 1 | |
| 13 | Листок: пухирчатість | слабка | 3 | |
| 14 | Листок: гофрованість біля головної жилки | слабка | 3 | |
| 15 | Листок: хвилястість краю | помірна | 5 | |
| 16 | Головка: покриття внутрішніми листками | відкрита | 1 | |
| 17 | Головка: за висотою | середня | 5 | |
| 18 | Головка: діаметр | середній | 5 | |
| 19 | Головка: форма поздовжнього розрізу | поперечно широко-еліптична | 2 | |
| 20 | За винятком сортів з трикутною головкою. Головка: закручування краю | помірне | 5 | |
| 21 | Головка: забарвлення | оранжеве | 3 | |
| 22 | Головка: горбкуватість | помірна | 5 | |
| 23 | Головка: текстура | помірна | 5 | |
| 24 | Головка: антоціанове забарвлення після збиральної стиглості | відсутнє | 1 | |
| 25 | Квітка: забарвлення | жовте | 2 | |
| 26 | Скоростиглість: за весняного садіння | середня | 5 | |
| 27 | Скоростиглість: за літнього садіння | середній осінній тип | 5 | |
| 28 | Чоловіча стерильність | ознака не визначалась | 0 | |

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 150. Товарна врожайність, т/га – 49. Період від повних сходів до початку достигання, діб – 75. Період плодоношення, діб – 10. Вміст білка, % – 2, вітаміну С, мг % – 60, загального цукру, % – 5, сухої речовини, % – 10. Стійкість до хвороб, балів (1–9): бактеріоз слизовий – 5, бактеріоз судинний – 5.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.