

**Вид:** Конюшина лучна (червона) *Trifolium pratense* L.

**Заявка № 23155001 Назва сорту:** МЕЛІФОР **Заявник (код):** 3227 **Власник сорту (код):** 3227

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 06.10.2023 **Патент № 230529**

**Дата пріоритету:** 06.09.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 05.10.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230744**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіннина: забарвлення шкірки	різнокольорове	3	
2	Плоїдність	диплоїд	2	
3	Сім'ядолі: за довжиною	довгі	7	
4	Сім'ядолі: за шириною	широкі	7	
5	Рослина: за висотою у рік сівки	середня	5	
6	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення у рік сівки	помірна	5	
7	Рослина: габітус восени у рік сівки	напівпрямий	3	
8	Рослина: тенденція до цвітіння у рік сівки	помірна	5	
9	Рослина: за висотою навесні	середня	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення весною	помірна	5	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Стебло: за довжиною	середнє	5	
13	Стебло: за товщиною	середнє	5	
14	Стебло: кількість міжвузлів	велика	7	
15	Стебло: щільність опушення	дуже нещільна	1	
16	Листок: форма центрального листочка	видовжена	1	
17	Листок: центральний листочок за довжиною	середній	5	
18	Листок: центральний листочок за шириною	середній	5	
19	Листок: частота наявності білих міток	висока	7	
20	Рослина: за природною висотою другого укосу	низька	3	

**За інформацією наданою заявником:**

**- показники господарської придатності**

Урожайність насіння (за стандартної вологості), т/га – 2,2. Збір сухої речовини, т/га – 7,8. Вміст у сухій речовині, %: білка – 22,2; клітковини – 19,8. Тривалість періоду від весняного відростання до укїсної стиглості, діб – 100. Тривалість періоду від весняного відростання до збиральної стиглості насіння, діб – 163. Кількість укосів, шт. – 2. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Маса 1000 насінин, г – 0,8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість до обсипання, бал (1–9) – 8. Облистяність, % – 58,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): борошниста роса (*Erysiphe communis* Grev. f. *trifolii* Rbnh.) – 8, іржа (*Uromyces fallens* Kern.) – 8, антракноз (*Kabatiella caulivora* Kat.) – 8, аскохітоз (*Ascochyta trifolii* Bond. et Trus.) – 8, бура плямистість (*Pseudopeziza trifolii* (Biv.-Bern.) Fuck.) – 8, бактеріоз (*Phytoponas trifoliorum* (L. R. Jones) Burkh.; *Pseudomonas trifoliorum* Stapp) – 8, фузаріозне в'янення (*Fusarium oxysporum* Schl.f. *trifolii* Railllo) – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.