

Вид: Морква *Daucus carota* L.

Заявка № 21109002 Назва сорту: Нью Курода АС **Заявник (код):** 2819 **Власник сорту (код):** 2819

Дата пріоритету: 09.09.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230912

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Листки: розетка за шириною	середня	5	
2	Листок: положення	напівпряме	3	
3	Листок: за довжиною (включаючи черешок)	дуже довгий	9	
4	Листок: розсіченість	тонка	3	
5	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
6	Листок: антоціанове забарвлення черешка	наявне	9	
7	Коренеплід: за довжиною	середній	5	
8	Коренеплід: за шириною	середній	5	
9	Коренеплід: відношення довжина / ширина	середнє	5	
10	Коренеплід: форма поздовжнього розрізу	від вузькотрикутної до вузьковидовженої	5	
11	Сорти оцінені за ознаками 7, 8, 10. Коренеплід: тенденція до конічної форми	слабка	3	
12	Коренеплід: форма плеча	плеската	1	
13	Коренеплід: кінчик (за повного розвитку)	ледь загострений	2	
14	Коренеплід: забарвлення поверхні	оранжеве	3	
15	За винятком сортів із білим зовнішнім забарвленням коренеплоду. Коренеплід: інтенсивність забарвлення поверхні	помірна	5	
16	Коренеплід: антоціанове забарвлення поверхні плеча	наявне	9	
17	Коренеплід: площа зеленого забарвлення поверхні плеча	мала	3	
18	Коренеплід: борозенчастість поверхні	слабка	3	
19	Коренеплід: діаметр серцевини відносно загального діаметра	середній	5	
20	Коренеплід: забарвлення серцевини	оранжеве	3	
21	За винятком сортів із білою серцевиною. Коренеплід: інтенсивність забарвлення серцевини	помірна	5	
22	Коренеплід: забарвлення флоєми	оранжеве	3	
23	За винятком сортів із білою флоємою. Коренеплід: інтенсивність забарвлення флоєми	помірна	5	
24	Коренеплід: забарвлення серцевини порівняно із забарвленням флоєми	однакове	2	
25	Коренеплід: інтенсивність зеленого забарвлення внутрішньої частини (у поздовжньому розрізі)	слабка	3	
26	Коренеплід: надземна частина	мала	3	
27	Тільки сорти з тупими кінчиками. Коренеплід: час розвитку заокругленого кінчика	ознака не визначається	0	
28	Коренеплід: час забарвлення кінчика в поздовжньому розрізі	пізній	7	
29	Рослина: тенденція до стрілкування	відсутня або дуже слабка	1	
30	Рослина: висота першого зонтика під час його цвітіння	ознака не визначалась	0	
31	Рослина: частка рослин з чоловічою стерильністю	відсутні або дуже мала	1	
32	Рослина: тип чоловічої стерильності	коричневі пиляки	1	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 55. Тривалість періоду від появи сходів до споживчої стиглості, днів – 80. Вміст каротину, мг% – 16,5; загального цукру, % – 8; сухої речовини, % – 12. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): альтернаріоз – 9, гниль біла – 9, гниль суха – 9, гниль мокра бактеріальна – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛ.