

**Вид:** Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

**Заявка № 22118001 Назва сорту:** Експо **Заявник (код):** 2813 **Власник сорту (код):** 2813

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 10.10.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230793**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	ознака не визначалась	0	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	наявне	9	
3	Сім'ядолі: розмір	середній	5	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	пряме	1	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	оберненояйцеподібна	3	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	сіруватий	3	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мала	3	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	великий	7	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	вузькопрямокутна	7	
20	Коренеплід: форма верхівки	плеската	2	
21	Коренеплід: форма основи	плеската	5	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	двокольорове	2	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	яскраво-червоне (забарвлення кіноварі)	1	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	малий	3	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	середній	5	
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	слабка	3	
30	Коренеплід: за довжиною	довгий	7	
31	Коренеплід: форма плеча	тупа	3	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до досягання, дів – 30. Середня маса плоду, г – 50. Вміст сухої речовини, % – 5,3; вітаміну С, мг/% – 20. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 9, гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 9, чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.