

Вид: Салат посівний головчастий *Lactuca sativa L. var. capitata***Заявка № 23421001 Назва сорту:** Скайфос **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.10.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230740****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	біле	1	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	наявне	9	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	середні	5	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	еліптична	5	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листок: за цілісністю (як для 5)	цілісний	1	
7	Рослина: діаметр	середній	5	
8	Рослина: ступінь перекривання верхньої частини листків	середній	2	
9	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
10	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: за щільністю	помірна	5	
11	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: розмір	середній	5	
12	Лише для сортів маслянисто-головчастого типу у теплицях. Головка: перекривання верхніх частин листків	середнє	5	
13	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: середній і сильний. Головка: форма у поздовжньому перерізі	округла	3	
14	Листок: за товщиною	середній	5	
15	Листок: положення зовнішніх листків за збиральною стиглості	напівпрямe	3	
16	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленування: відсутня або дуже мала. Листок: форма	округла	4	
17	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленування: відсутня або дуже мала. Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: забарвлення	ознака не визначалась	0	
19	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
20	Листок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	сильна	7	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	локальнe	1	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	дифузний і плямами	3	
24	Листок: глянсуватість верхнього боку	помірна	5	
25	Листок: пухирчастість	слабка	3	
26	Листок: розмір пухирців	середній	5	
27	Листок: хвильистість краю	відсутня або дуже слабка	1	
28	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка	найдви	9	
29	Листок: надрізаність краю верхньої частини листка за глибиною	дуже мілка	1	
30	Листок: щільність надрізаності краю	помірна	5	
31	Листок: за типом надрізаності	городчастий	1	
32	Листкова пластина: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне галуження	слабке	3	
34	Час збиральної стиглості	середній	5	
35	Час початку стрілкування	пізній	7	
36	Рослина: за висотою (під час квітування)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасциація (під час квітування)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасциації (під час квітування)	дуже слабка	1	
39	Стійкість проти збудника борошнистої роси <i>Bremia lactucae</i> (Bl). Ізолят Bl: 16 EU, 17 EU, 20-27 EU, 29-31 EU, 33 EU, 35 EU	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV). Патотип II	наявна	9	
41	Стійкість проти попелниць <i>Nasonovia ribis nigri</i> (Nr). Біотип Nr: 0	наявна	9	
42	Стійкість проти збудника фузаріозу <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i> (Fol). Раса 1	відсутня	1	
43	Листок: відтінок антоціанового забарвлення	коричнюватий	3	
44	Тільки для сортів із Рослини: ступінь перекривання верхньої частини листків: відсутній або slabкий. Рослина: кількість листків	ознака не визначалась	0	
45	Листок: кількість розчленування	відсутня або дуже мала	1	
46	Тільки для сортів із Листок: кількість розчленування: відсутня або дуже мала Листок: у поздовжньому перерізі	увігнутий	1	
47	Тільки для сортів дуболистого типу. Листок: лопаті за ширину	ознака не визначається	0	
48	Листок: площа антоціанового забарвлення	велика	7	
49	Тільки для сортів із Листок: вторинна надрізаність краю за глибиною для неправильно зубчастих, дво- або тризубчастих листків	ознака не визначалась	0	
50	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за довжиною	ознака не визначається	0	
51	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: за ширину	ознака не визначається	0	
52	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: форма у поздовжньому перерізі	ознака не визначається	0	
53	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення	ознака не визначається	0	
54	Тільки для сортів стеблового типу. Стебло: забарвлення м'якоті	ознака не визначається	0	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Товарна врожайність, т/га – 22,7. Середня маса головки, г – 387. Щільність головки, бал (1–9) – 6. Тривалість періоду від повних сходів до технічної стигlosti, діб – 58. Група стигlosti: середня – 5. Вміст у головках: сухої речовини, % – 5; цукрів, % – 1,9; вітаміну С, мг% – 2,9. Холодостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжньої борошнистої роси (*Bremia lactucae* Regel f. *sonchi* (Schw.) Dzhanuz) – 8, чорної гнилі (*Rhizoctonia solani* Kuhn) – 8, септоріозу (*Septoria lactucae* Pass.) – 7, вірусу мозаїки (*Lactuca virus*) – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Згр.