

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 20106006 Назва сорту: АЛМАНЗОРО Заявник (код): 1852 Власник сорту (код): 1852

Дата пріоритету: 10.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230892

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| №    | Ознака   | Проявлення                  | Код | Примітка |
|------|--|-----------------------------|-----|----------|
| 1    | Рослина: кількість листків на псевдостеблі   | середня                     | 5   |          |
| 2    | Листки: положення  | від прямого до напівпрямого | 2   |          |
| 3    | Листки: восковий наліт   | помірний                    | 5   |          |
| 4    | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення   | помірна                     | 5   |          |
| 5    | Листки: зігнутість   | відсутня або слабка         | 1   |          |
| 6,1  | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною   | довгий                      | 7   |          |
| 6,2  | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною   | ознака не визначається      | 0   |          |
| 7,1  | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр   | середній                    | 5   |          |
| 7,2  | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр   | ознака не визначається      | 0   |          |
| 8    | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка)  | середнє                     | 5   |          |
| 9    | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини)  | середній                    | 5   |          |
| 10   | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинка (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка    | 1   |          |
| 11   | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинка (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини)  | відсутній або дуже слабкий  | 1   |          |
| 12,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір  | великий                     | 7   |          |
| 12,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір   | ознака не визначається      | 0   |          |
| 13,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою  | висока                      | 7   |          |
| 13,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою   | ознака не визначається      | 0   |          |
| 14,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр   | великий                     | 7   |          |
| 14,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр  | ознака не визначається      | 0   |          |
| 15,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр   | середнє                     | 5   |          |
| 15,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр  | ознака не визначається      | 0   |          |
| 16   | Цибулина / цибулинка: позиція максимального діаметра   | посередині                  | 2   |          |
| 17   | Цибулина / цибулинка: шийка за шириною   | вузька                      | 3   |          |
| 18   | Цибулина / цибулинка: форма (поздовжнього розрізу)   | округла                     | 4   |          |
| 19   | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18)  | округла                     | 4   |          |
| 20   | Цибулина / цибулинка: форма основи (як для 18)   | округла                     | 3   |          |
| 21   | Цибулина / цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання  | помірна                     | 5   |          |
| 22   | Цибулина / цибулинка: суха шкірка за товщиною  | середня                     | 5   |          |
| 23   | Цибулина / цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки   | коричневе                   | 5   |          |
| 24   | За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки                  | помірна                     | 5   |          |
| 25   | Цибулина / цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення)                                      | коричнюватий                | 5   |          |
| 26   | Цибулина / цибулинка: забарвлення соковитих лусок  | зеленувате                  | 2   |          |
| 27   | Цибулина / цибулинка: кількість точок зростання на кг  | мала                        | 3   |          |
| 28   | Цибулина / цибулинка: вміст сухої речовини   | низький                     | 3   |          |
| 29   | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби   | відсутня або дуже слабка    | 1   |          |
| 30   | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби  | ознака не визначається      | 0   |          |
| 31   | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени   | помірна                     | 5   |          |
| 32   | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени  | середній                    | 5   |          |
| 33   | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин)                               | середній                    | 5   |          |
| 34,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33)  | середній                    | 5   |          |
| 34,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33)  | ознака не визначається      | 0   |          |
| 35   | Час проростання за зберігання цибулин  | середній                    | 5   |          |
| 36   | Чоловіча стерильність  | висока                      | 3   |          |

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 97. Товарна врожайність, т/га – 95. Тривалість вегетації рослин, днів – 115. Маса цибулини, г – 180. Вміст в цибулині: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 8, сухої речовини, % – 13, загального цукру % – 9. Лежкість, днів – 240. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 9, несправжня борошниста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 9. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.**