

Вид: Цибуля городня *Allium cepa* L.

Заявка № 22106006 Назва сорту: Фасто **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 24.10.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230915

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|------|--|--------------------------|-----|----------|
| 1 | Рослина: кількість листків на псевдостеблі | середня | 5 | |
| 2 | Листки: положення | напівпряме | 3 | |
| 3 | Листки: восковий наліт | помірний | 5 | |
| 4 | Листки: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 5 | Листки: зігнутість | відсутня або слабка | 1 | |
| 6,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: за довжиною | середній | 5 | |
| 6,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: за довжиною | ознака не визначається | 0 | |
| 7,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Листок: діаметр | середній | 5 | |
| 7,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Листок: діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 8 | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: за довжиною (до найвищого зеленого листка) | середнє | 5 | |
| 9 | Тільки сорти цибулі городньої. Псевдостебло: діаметр (посередині довжини) | середній | 5 | |
| 10 | Тільки сорти, що розмножуються насінням. Цибулина: тенденція до розщеплення на цибулинки (з сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 11 | Цибулина: ступінь розщеплення на цибулинки (із сухою шкіркою навколо кожної цибулини) | ознака не визначалась | 0 | |
| 12,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: розмір | середній | 5 | |
| 12,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: розмір | ознака не визначається | 0 | |
| 13,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: за висотою | середня | 5 | |
| 13,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: за висотою | ознака не визначається | 0 | |
| 14,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: діаметр | середній | 5 | |
| 14,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 15,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: відношення висота / діаметр | середнє | 5 | |
| 15,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Цибулинка: відношення висота / діаметр | ознака не визначається | 0 | |
| 16 | Цибулина / цибулинка: позиція максимального діаметра | посередині | 2 | |
| 17 | Цибулина / цибулинка: шийка за шириною | середня | 5 | |
| 18 | Цибулина / цибулинка: форма (поздовжнього розрізу) | округла | 4 | |
| 19 | Тільки сорти цибулі городньої. Цибулина: форма верхівки (як для 18) | округла | 4 | |
| 20 | Цибулина / цибулинка: форма основи (як для 18) | округла | 3 | |
| 21 | Цибулина / цибулинка: міцність тримання сухої шкірки після збирання | сильна | 7 | |
| 22 | Цибулина / цибулинка: суха шкірка за товщиною | середня | 5 | |
| 23 | Цибулина / цибулинка: основне забарвлення сухої шкірки | коричневе | 5 | |
| 24 | За винятком сортів із білою сухою шкіркою. Цибулина / цибулинка: інтенсивність основного забарвлення сухої шкірки | помірна | 5 | |
| 25 | Цибулина / цибулинка: відтінок забарвлення сухої шкірки (на додаток до основного забарвлення) | коричнюватий | 5 | |
| 26 | Цибулина / цибулинка: забарвлення соковитих лусок | зеленувате | 2 | |
| 27 | Цибулина / цибулинка: кількість точок зростання на кг | дуже мала | 1 | до малої |
| 28 | Цибулина / цибулинка: вміст сухої речовини | низький | 3 | |
| 29 | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за весняної сівби | відсутня або дуже слабка | 1 | |
| 30 | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за весняної сівби | ознака не визначається | 0 | |
| 31 | Тільки сорти цибулі городньої. Тенденція до стрілкування за сівби восени | ознака не визначалась | 0 | |
| 32 | Тільки сорти цибулі городньої. Час стрілкування за сівби восени | ознака не визначається | 0 | |
| 33 | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за сівби восени (листя обпало на 80% рослин) | ознака не визначалась | 0 | |
| 34,1 | Тільки сорти цибулі городньої. Час збиральної стиглості за весняної сівби (як для 33) | середній | 5 | |
| 34,2 | Тільки сорти цибулі шалот. Час збиральної стиглості (як для 33) | ознака не визначається | 0 | |
| 35 | Час проростання за зберігання цибулин | пізній | 7 | |
| 36 | Чоловіча стерильність | відсутня або дуже низька | 1 | |

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 80. Товарна врожайність, т/га – 75. Тривалість вегетації рослин, діб – 100. Маса цибулини, г – 130. Вміст в цибуліні: вітаміну С, мг/100 г с.р. – 27, сухої речовини, % – 13, загального цукру % – 15. Лежкість, діб – 210. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гнилі – 8, несправжня борошніста роса (*Peronospora Schleidenii* Unger.) – 8. Стійкість проти заселення (пошкодження) шкідниками, бал (1–9): цибулева муха (*Delia antiqua* Mg.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.