

Вид: Актинідія пурпурова x актинідія гостра *Actinidia purpurea* Rehd. x *Actinidia arguta* Planch.
Заявка № 23368002 Назва сорту: Фортуна **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348
Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 06.10.2023 **Патент № 230576**
Дата пріоритету: 12.04.2023
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 16.10.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 230836
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: стать	жіноча	1	
2	Рослина: самоплідність	відсутня	1	
3	Рослина: за силою росту	сильна	7	
4	Молодий пагін: щільність ворсинок	дуже нещільні	1	
5	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки	відсутнє або дуже слабке	1	
6	Стебло: за товщиною	середнє	2	
7	Стебло: забарвлення пагона з-під сонячного боку	зелено-біле	1	
8	Стебло: текстура кори	гладенька	1	
9	Стебло: ворсинки за щільністю	відсутні або нещільні	1	
10	Стебло: розмір сочевичок	середній	3	
11	Стебло: кількість сочевичок	велика	7	
12	Стебло: випуклість брунькового виступу	середня	3	
13	Стебло: покриття бруньки	наявне	9	
14	Стебло: розмір отвору в покритті бруньки	малий	1	
15	Стебло: листковий рубець	плаский	1	
16	Стебло: серцевина	шарувата	2	
17	Листкова пластинка: форма	ланцетна	1	
18	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	велике	7	
19	Листкова пластинка: форма верхівки	хвостата	1	
20	Листкова пластинка: базальні часточки	торкаються	4	
21	Листкова пластинка: кількість війчастих зубців	велика	7	
22	Листкова пластинка: волоски на верхньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
23	Листкова пластинка: волоски на нижньому боці за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
24	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку	сильна	7	
25	Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку	помірно зелене	3	
26	Листкова пластинка: строкате забарвлення	відсутнє	1	
27	Листкова пластинка колір строкатого забарвлення	ознака не визначається	0	
28	Листок: відношення довжини черешка до довжини пластинки	середнє	5	
29	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	слабке	3	
30	Суцвіття: тип	дихазій	2	
31	Суцвіття: кількість квіток	середня	3	
32	Генеративна брунька: положення першої луски	середнє	2	
33	Квітка: кількість чашолистків	середня	2	
34	Квітка: основне забарвлення чашолистків	біле	1	
35	Квітка: волосинки на чашолистках за щільністю	відсутні або дуже нещільні	1	
36	Квітка: діаметр	середній	5	
37	Квітка: розташування пелюсток	перекриваються	3	
38	Квітка: вигляд з боку	випукла	3	
39	Квітка: кількість маточок	мала	1	
40	Квітка: положення маточок	пряме	1	
41	Пелюстка: забарвлення адаксального боку	зеленувато-біле	2	
42	Пелюстка: розподіл забарвлення	однорідний	2	
43	Пелюстка: вторинне забарвлення верхнього боку	відсутнє	1	
44	Пелюстка: розподіл вторинного забарвлення	ознака не визначається	0	
45	Піляк: забарвлення	сіре	3	
46	Плід: маса	середня	5	
47	Плід: за довжиною	середній	5	
48	Плід: за шириною	середній	5	
49	Плід: відношення довжина / ширина	мале	3	
50	Плід: форма	видовжена	2	
51	Плід: форма поперечного перерізу (посередні)	поперечноеліптична	3	
52	Плід: маточковий кінець	тупий (сильно виступає)	6	
53	Плід: ступінь загостреності	сильний	3	
54	Плід: кільце чашечки	помірно виражене	2	
55	Плід: форма плеча базальної частини	зрізана	1	
56	Плід: плодоніжка за довжиною	середня	5	
57	Плід: довжина плодоніжки відносно довжини плоду	середня	5	
58	Плід: прояв сочевичок на шкірці	слабкий	1	
59	Плід: ворсистість шкірки	відсутня	1	
60	Плід: ворсинки за щільністю	ознака не визначається	0	
61	Плід: забарвлення ворсинок	ознака не визначається	0	
62	Плід: з'єднання ворсинок із шкіркою	ознака не визначається	0	
63	Плід: забарвлення шкірки	зелене	2	
64	Плід: з'єднання шкірки із м'якоттю	помірне	2	
65	Плід: забарвлення зовнішнього оплодня	світло-зелене	1	
66	Плід: забарвлення камер	зеленувато-жовте	4	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
67	Плід: поширення червонуватого забарвлення вздовж камер	дуже слабке	1	
68	Плід: інтенсивність червонуватого забарвлення на камерах	слабка	3	
69	Плід: відношення ширина серцевини / діаметр плоду	середнє	5	
70	Плід: основна форма серцевини в поперечному перерізі	поперечноеліптична	3	
71	Плід: забарвлення серцевини	зеленувато-біле	2	
72	Плід: цукристість	середня	5	
73	Плід: кислотність	низька	3	
74	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
75	Час початку цвітіння	середній	5	
76	Час збиральної стиглості	дуже ранній	1	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Група стиглості: дуже рання – 1. Самоплідність: відсутня – 9. Час збиральної стиглості: ранній – 1. Урожайність, т/га – 16,5. Середня маса плоду, г – 9,8. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 41,3; каротину, мг/100 г – 0,36. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 8. Транспортабельність, бал (1–9) – 8. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плямистість листків (*Septoria piricola* Desm) – 9, сіра плодова гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.