

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 20045043 Назва сорту:** АТРАКТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 10.02.2023 **Патент № 230131**

**Дата пріоритету:** 03.12.2020

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231099**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (тричастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	сіре	1	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	від дуже раннього до раннього	2	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,49	3,68	3,27
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	0,60	0,33
+, - до усередненої урожайності, %	34,6	19,5	11,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	98	110	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	157,9	184,7	180,6
Висота рослини, см	66,1	92,2	90,4
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	10,3	11,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	7
Вміст білка, %	39,4	40	39,2
Вміст олії, %	23,2	22	22,4
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.