

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 17045056 Назва сорту:** Златопільська **Заявник (код):** 2606 **Власник сорту (код):** 2606

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231096**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкоюяцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,20	2,89	2,64
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,35	-0,19	-0,30
+, - до усередненої урожайності, %	18,9	-6,2	-10,2
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	99	114	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	167,2	182,3	159,6
Висота рослини, см	73,2	84,5	85,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,4	10,8	11,2
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	7	8	8
Стійкість до посухи, бал	5	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	8	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	40,3	40,3	38,4
Вміст олії, %	21,4	20,7	21,6
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.**