

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 17045055 Назва сорту: Каменя Заявник (код): 2606 Власник сорту (код): 2606

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231095

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,26	3,16	2,99
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,19	-0,04	-0,01
+, - до усередненої урожайності, %	57,5	-1,2	-0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, днів	118	122	132
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	158,4	152,3	134,5
Висота рослини, см	71	89,2	99
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,9	12,7	14,5
Стійкість до вилягання, бал	8	6	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37,3	39,2	35,9
Вміст олії, %	22,9	22,8	23,2
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.