

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045009 Назва сорту: Кобуко Заявник (код): 1669 Власник сорту (код): 1669

Дата пріоритету: 02.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231062

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,03	3,68	3,42
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,18	0,60	0,48
+, - до усередненої урожайності, %	63,8	19,5	16,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	119
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	204,3	197,5	183,6
Висота рослини, см	65,8	84,8	90,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,7	12,7	14,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	39	39,1	37,3
Вміст олії, %	22,4	22,3	22,9
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.