

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045042 Назва сорту: КОМБІНАТОР **Заявник (код):** 806 **Власник сорту (код):** 806

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 10.02.2023 **Патент №** 230130

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231098

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	помірна	5	
3	Рослина: тип росту	напівдетермінантний	2	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,77	3,52	3,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,70	0,32	0,37
+, - до усередненої урожайності, %	33,8	10,0	12,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	115	117	126
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	169,1	176,2	171,7
Висота рослини, см	66,7	87,7	89,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	12,3	12,3	17,5
Стійкість до вилягання, бал	8	9	7
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	8
Стійкість до посухи, бал	6	7	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	9	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	41,8	43,2	42,8
Вміст олії, %	20,9	19,5	19,5
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.