

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045020 Назва сорту: ОАЦ Камран **Заявник (код):** 2557 **Власник сорту (код):** 2557

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231065

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

| № | Ознака | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|----------------------------|-----|----------|
| 1 | Гіпокотиль: антоціанове забарвлення | наявне | 9 | |
| 2 | Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення | помірна | 5 | |
| 3 | Рослина: тип росту | детермінантний | 1 | |
| 4 | Рослина: габітус (характер росту) | прямий | 1 | |
| 5 | Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині) | рудувато-коричневе | 2 | |
| 6 | Рослина: за висотою | середня | 5 | |
| 7 | Листок: пухирчастість | помірна | 5 | |
| 8 | Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка) | загостренояцеподібна | 3 | |
| 9 | Листок: розмір бічного листочка | середній | 5 | |
| 10 | Листок: інтенсивність зеленого забарвлення | помірна | 5 | |
| 11 | Квітка: забарвлення | фіолетове | 2 | |
| 12 | Біб: інтенсивність коричневого забарвлення | сильна | 7 | |
| 13 | Насінина: розмір | великий | 7 | |
| 14 | Насінина: форма | округло-видовжена | 5 | |
| 15 | Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують) | жовте | 1 | |
| 16 | Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази | ознака не визначена | 0 | |
| 17 | Насінина: забарвлення рубчика | сіре | 1 | |
| 18 | Насінина: забарвлення сім'янки рубчика | як у насінній оболонці | 1 | |
| 19 | Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою) | від раннього до середнього | 4 | |
| 20 | Рослина: час досягання | середній | 5 | |

Результат польових досліджень показників господарської придатності

| Показник | Значення | | |
|---|----------|----------|----------|
| | С | Л | П |
| Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га | 2,07 | 3,20 | 3,00 |
| Урожайність (за стандартної вологості), т/га | 2,84 | 3,31 | 3,54 |
| +, - до усередненої урожайності, т/га | 0,77 | 0,11 | 0,54 |
| +, - до усередненої урожайності, % | 37,2 | 3,4 | 18,0 |
| Довірчий інтервал, т/га | 0,09 | 0,07 | 0,07 |
| Тривалість періоду вегетації, дб | 123 | 122 | 126 |
| Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г | 202,8 | 212,8 | 183,3 |
| Висота рослини, см | 62,6 | 82 | 86,7 |
| Висота прикріплення нижнього бобу, см | 10,4 | 10,5 | 12,2 |
| Стійкість до вилягання, бал | 9 | 8 | 9 |
| Стійкість до обсипання, бал | 8 | 8 | 9 |
| Стійкість до посухи, бал | 8 | 9 | 9 |
| Стійкість проти пероноспорозу, бал | 9 | 9 | 7 |
| Стійкість проти аскохітозу, бал | 8 | 9 | 9 |
| Стійкість проти бактеріозу, бал | 8 | 8 | 8 |
| Стійкість проти септоріозу, бал | 8 | 7 | 7 |
| Стійкість проти фузаріозу, бал | 7 | 9 | 8 |
| Вміст білка, % | 40,4 | 42,6 | 38,1 |
| Вміст олії, % | 22,4 | 20,6 | 22,5 |
| Блок (Група стиглості) | 7 | 7 | 7 |
| Напрямок використання | зерн | зерн | зерн |
| Якість | сбіл, вл | сбіл, сл | сбіл, вл |

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.