

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.
Заявка № 22045024 Назва сорту: СТАЙН 02Н23 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788
Дата пріоритету: 09.03.2022
Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023
Свідоцтво про державну реєстрацію № 231154
Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренойцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	слабка	3	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,08	3,40	3,68
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,01	0,20	0,68
+, - до усередненої урожайності, %	48,8	6,3	22,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, дб	124	126	129
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	189,7	202,9	185,7
Висота рослини, см	58,1	74,8	83,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11	11,5	12,2
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	9
Стійкість до посухи, бал	6	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	36,9	38,3	36,2
Вміст олії, %	23,5	22	22,8
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.