

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045021 Назва сорту: СТАЙН 06Н02 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

Дата пріоритету: 04.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	коричневе	5	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,71	3,32	3,53
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,64	0,12	0,53
+, - до усередненої урожайності, %	30,9	3,8	17,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, днів	122	126	131
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	158,6	181	171,5
Висота рослини, см	56,4	70,8	85,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	7,8	9,5	13,8
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	4	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	7	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	37,2	39,4	36,1
Вміст олії, %	23,1	21,2	22,6
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напряма використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.