

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045023 Назва сорту: СТАЙН 12Н23 Заявник (код): 2788 Власник сорту (код): 2788

Дата пріоритету: 09.03.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231153

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,86	3,31	3,34
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,79	0,11	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	38,2	3,4	11,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	123	126	133
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	186,4	204,4	178,3
Висота рослини, см	58,5	77,5	85,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,7	12,3	14,3
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	8	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	7	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	37,7	39,2	36,7
Вміст олії, %	23,9	21,3	22,1
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.