

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 22045022 Назва сорту:** СТАЙН 20Н23 **Заявник (код):** 2788 **Власник сорту (код):** 2788

**Дата пріоритету:** 09.03.2022

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231152

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	сіре	1	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,05	3,25	3,40
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,98	0,05	0,40
+, - до усередненої урожайності, %	47,3	1,6	13,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, днів	126	129	141
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	156	155,8	154
Висота рослини, см	63,2	76,8	92
Висота прикріплення нижнього бобу, см	9,6	11,3	13,7
Стійкість до вилягання, бал	9	7	8
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	8
Стійкість до посухи, бал	7	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	9
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	36,6	39	35,1
Вміст олії, %	23	21,3	22,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напряма використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.