

Вид: Ріпак (ярий) *Brassica napus L. oleifera*

Заявка № 21041002 Назва сорту: Коктейль КЛ Заявник (код): 912 Власник сорту (код): 912

Дата пріоритету: 23.11.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231069

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насіння: ерукова кислота	відсутня	1	
2	Сім'ядоля: за довжиною	середня	5	
3	Сім'ядоля: за шириною	середня	5	
4	Листок: інтенсивність зеленого кольору	помірний	5	
5	Листок: наявність часток	наявні	9	
6	Листок: кількість часток (повний розвиток листка)	багато	7	
7	Листок: зубчастість краю	помірна	5	
8	Листок: за довжиною (пластинка і черешок)	середній	5	
9	Листок: за шириною (у найширшому місці)	середній	5	
10	Сорти тільки з часточковими листками. Листок: довжина черешка	довгий	7	
11	Рослина: час цвітіння	середній	5	
12	Квітка: колір пелюсток	жовтий	3	
13	Квітка: довжина пелюсток	середні	5	до довгих
14	Квітка: ширина пелюсток	середні	5	до широких
15	Рослина: утворення пилку	наявне	9	
16	Рослина: за висотою (за повного цвітіння)	середня	5	до високої
17	Рослина: загальна довжина (бічні пагони включно)	довга	7	
18	Стручок: за довжиною (між ніжкою і зубцем)	довгий	7	
19	Стручок: довжина зубця	довгий	7	
20	Стручок: довжина ніжки	середня	5	до довгої
21	Тенденція формування суцвіття в рік весняної сівби	ознака не визначається	0	
22	Тенденція формування суцвіття в рік пізньолітньої сівби	відсутня або дуже слабка	1	

### Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		2,07	1,73
Урожайність (за стандартної вологості 12%), т/га		2,36	1,45
+, - до усередненої урожайності, т/га		0,29	-0,28
+, - до усередненої урожайності, %		14,0	-16,2
Довірчий інтервал, т/га		0,15	0,08
Тривалість періоду вегетації, діб		96	97
Висота рослини, см		91,5	93,8
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості 12%), г		5,7	4,6
Вміст білка, %		23,1	23,9
Вміст олії, %		44,4	43,9
Вміст ерукової кислоти, %		0,4	0,3
Вміст глюкозинолатів, %		0,4	0,3
Стійкість до вилягання, бал		9	8
Стійкість до обсипання, бал		7	7
Стійкість до посухи, бал		9	7
Стійкість проти пильщика ріпакового, бал		7	8
Стійкість проти квіткоїду ріпакового, бал		7	5
Стійкість проти бактеріозу, бал		8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал		8	7
Блок		1	1
Напрямок використання		олн	олн

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.