

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.

Заявка № 20088017 Назва сорту: Роставиця **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 14.11.2023 **Патент № 230706**

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230975

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	великий	7	
2	Світловий паросток: форма	конічна	3	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	сильне	7	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	відкрита	5	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	сильне	7	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	середня кількість	5	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	стебловий	1	
13	Рослина: габітус	прямий	3	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	сильне	7	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	проміжний	3	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	сильне	7	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	дуже великий	9	
21	Друга пара бічних листочків: за шириною	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрощення	рідко	3	
23	Листочок: хвилястість краю	слабка	3	
24	Листочок: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочок: глясуватість верхнього боку	помірно глясуватий	5	
26	Листочок: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	висока	7	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	відсутнє або мале	1	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час досягання	середній	5	
37	Бульба: форма	овальна	3	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	жовте	2	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	помірно жовте	4	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою. Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га		25,09	19,88
Урожайність, т/га		24,06	23,73
+ , - до усередненої урожайності, т/га		-1,03	3,85
+ , - до усередненої урожайності, %		-4,1	19,4
Довірчий інтервал, т/га		9,32	10,51
Тривалість періоду вегетації, днів		130	126
Середня маса товарної бульби, г		95,7	101,1
Вміст крохмалю, %		13,9	15,3
Збір крохмалю, т/га		33,44	36,31
Вміст сухої речовини, %		21,8	23,8
Дегустаційна оцінка, бал		5	5
Придатність до механізованого збирання, бал		9	8
Лежкість, бал		7	9
Товарність бульб, %		80,4	88,6
Стієкість проти макроспору, бал		7	9
Стієкість проти фітофторозу, бал		6	4
Стієкість до звичайного патотипу раку, 1 – нестійкий, 9 – стійкий, бал		9	9
Блок (група стиглості)		9	9
Напрямок використання		стл	стл
Якість		ск	ск

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.