

Вид: Люцерна посівна *Medicago sativa* L.

Заявка № 20196006 **Назва сорту:** Персія Носівська **Заявник (код):** 1990 **Власник сорту (код):** 1990

Дата пріоритету: 26.11.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 22.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231049

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: габітус восени першого року (2 тижні до рівнодення)	проміжний	5	
2	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після осіннього рівнодення після сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	до середньої
3	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після осіннього рівнодення (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
4	Рослина: за природною висотою навесні (один місяць після початку відростання другого року після сівби)	коротка	3	
5	Час початку цвітіння	середній	5	
6	Квітка: частота рослин з дуже темно-синьо-фіолетовими квітками	середня	5	
7	Квітка: частота рослин із змішаними квітками	низька	3	
8	Квітка: частота рослин з кремовими, білими або жовтими квітками	відсутня або дуже низька	1	
9	Рослина: за довжиною найдовшого стебла за повного цвітіння (включаючи повністю сформоване суцвіття)	довга	7	
10	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 1-го скошування	середня	5	
11	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 2-го скошування	середня	5	
12	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 3-го скошування	середня	5	
13	Рослина: за природною висотою через 3 тижні після 4-го скошування	низька	3	
14	Рослина: за природною висотою через 2 тижні після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні до рівнодення)	низька	3	до середньої
15	Рослина: за природною висотою через 6 тижнів після наступного дня осіннього рівнодення у рік сівби (скошування за 2 тижні після рівнодення)	низька	3	
16	Рослина: тенденція до зростання під час зими	стан спокою клас 4	4	
17	Стійкість проти <i>Verticillium albo-atrum</i>	наявна	9	
18	Стійкість проти <i>Ditylenchus dipsaci</i>	наявна	9	
19	Стійкість проти <i>Colletotrichum trifolii</i>	наявна	9	
20	Стійкість проти <i>Phytophthora medicaginis</i>	наявна	9	
21	Стійкість проти <i>Acyrhosiphon kondoi</i>	наявна	9	
22	Стійкість проти <i>Theroaphis maculata</i>	наявна	9	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сухої речовини сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	6,48	10,52	10,75
Урожайність сухої речовини, т/га	5,64	13,85	12,83
+,- до усередненої урожайності, т/га	-0,84	3,33	2,08
+,- до усередненої урожайності, %	-13,0	31,7	19,3
Довірчий інтервал, т/га	0,78	1,42	1,34
Тривалість періоду вегетації, діб	100	163	112
Залишняність, %	51,6	66,5	45,9
Вміст білка, %	19,5	23,4	17,9
Стійкість до вилягання, бал	7	7	8
Стійкість до посухи, бал	7	6	7
Стійкість проти іржі, бал	8	7	9
Стійкість проти борошнистої роси, бал	9	7	9
Стійкість проти бурої плямистості, бал	9	7	9
Зимостійкість, бал	9	7	7
Урожайність насіння (середнє за 4 повторення), т/га	2,5	1,9	1,9
Блок	1	1	1
Напрям використання	корм	корм	корм

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.