

Вид: Помідор юстівний *Solanum lycopersicum* L.**Заявка № 21115035 Назва сорту:** ХАКІМАРУ **Заявник (код):** 1852 **Власник сорту (код):** 1852**Дата пріоритету:** 30.11.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.11.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230982****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотиля	наявне	9	
2	Рослина: тип розвитку	індегермінантний	2	
3	Лише детермінантні сорти. Рослина: кількість міжузлів на головному стеблі (бічні стебла видаляють)	ознака не визначається	0	
4	Стебло: антоціанове забарвлення у верхній третині	відсутнє або дуже слабке	1	до слабкого
5	Лише індегермінантні сорти. Стебло: міжузля за довжиною між 1 і 4 сучвіттям	довге	7	до дуже дового
6	Листок: положення (у середній третині рослини)	напівлонгле	7	
7	Листок: за довжиною	довгий	7	
8	Листок: за шириною	широкий	7	
9	Листок: за розсіченістю	двічі перистий	2	
10	Листок: розмір листочків (у середній частині листка)	середній	5	до великого
11	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	до сильної
12	Листок: глянсуватість (як для б)	слабка	3	до помірної
13	Листок: пухирчастість (як для б)	слабка	3	до помірної
14	Листок: розмір пухирів (як для б)	середній	5	
15	Листок: положення черешка листочків відносно головної осі	горизонтальне	5	
16	Суцвіття: за типом	переважно не галузисте	1	
17	Квітка: фасціація (перша квітка суцвіття)	відсутня	1	
18	Квітка: опушенні приймочки маточки	наявне	9	
19	Квітка: забарвлення	жовте	1	
20	Квітконіжка: відокремлюючий шар	наявний	9	
21	Лише для сортів, що мають відокремлюючий шар. Квітконіжка: за довжиною (від відокремлюючого шару до чащечки)	середня	5	
22	Плід: розмір	великий	7	
23	Плід: відношення довжини до діаметра	мале	3	
24	Плід: форма поздовжнього розрізу	сплюснута	2	
25	Плід: ребристість біля плодоніжки	слабка	3	до помірної
26	Плід: форма поперечного перерізу	кругляста	2	
27	Плід: загиблення біля плодоніжки	помірне	5	
28	Плід: розмір рубця плодоніжки	великий	7	
29	Плід: розмір квіткового рубця	великий	7	
30	Плід: форма кінця плоду	плеската	3	
31	Плід: діаметр серцевини в поперечному перерізі	малий	3	
32	Плід: перикарпій за товщиною	товстий	7	
33	Плід: кількість насіннєвих камер	чотири, п'ять або шість	4	
34	Плід: зелене плече (перед достиранням)	відсутнє	1	
35	Плід: розмір зеленого плеча (перед достиранням)	ознака не визначається	0	
36	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення плеча (перед достиранням)	ознака не визначається	0	
37	Плід: інтенсивність зеленого забарвлення (за винятком плеча) (перед достиранням)	помірна	5	
38	Плід: забарвлення (за достирання)	рожеве	4	
39	Плід: забарвлення мякоті (за достирання)	червоне	5	
40	Плід: за твердістю	помірний	5	
41	Плід: термін лежкості	помірний	5	
42	Час цвітіння	середній	5	
43	Час достирання	середній	5	
44	Плід: вміст сухої речовини (за достирання)	високий	7	
45	Чутливість до сріблястості	ознака не визначалась	0	
46	Стійкість проти <i>Meloidogyne incognita</i>	наявна	9	
47	Стійкість проти <i>Verticillium dahliae</i>	наявна	9	
48	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	наявна	9	
49	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis lycopersici</i>	наявна	9	
50	Стійкість проти <i>Cladosporium fulvum</i> (<i>Fulvia fulva</i>)	наявна	9	
51	Стійкість проти Tomato Mosaic Virus	наявна	9	
52	Стійкість проти <i>Phytophthora infestans</i>	ознака не визначалась	0	
53	Стійкість проти <i>Pyrenophaeta lycopersici</i>	ознака не визначалась	0	
54	Стійкість проти <i>Stemphylium</i> spp.	ознака не визначалась	0	
55	Стійкість проти <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	ознака не визначалась	0	
56	Стійкість проти <i>Ralstonia solanacearum</i>	ознака не визначалась	0	
57	Стійкість проти Tomato Yellow Leaf Curl Virus	ознака не визначалась	0	
58	Стійкість проти Tomato Spotted Wilt Virus	відсутня	1	
59	Стійкість проти <i>Leveillula taurica</i>	ознака не визначалась	0	
60	Стійкість проти <i>Oidium lycopersicum</i>	наявна	9	
61	Стійкість проти Tomato torrado virus (ToTV)	наявна	9	

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
62	Лише індeterminантні сорти. Рослина: за висотою	висока	7	
63	Плід: зелені смуги (перед досягненням)	відсутні	1	
64	Плід: глянсуватість шкірки	помірна	2	
65	Плід: епідерміс	знебарвлений	1	

За інформацією наданою заявником:**– показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 200. Вміст каротину, мг % – 3,5; сухої речовини в плоді, % – 6; вітаміну С, мг % – 12; загального цукру, % – 4,5. Загальна кислотність, % – 1. Маса товарного плоду, г – 190. Період від повних сходів до початку дозрівання, діб – 100. Тривалість періоду плодоношення, діб – 63.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.