

**Вид:** Шпинат городній *Spinacia oleracea* L.

**Заявка № 21130001 Назва сорту:** Траверс **Заявник (код):** 840 **Власник сорту (код):** 840

**Дата пріоритету:** 13.10.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 29.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231134

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Паросток: сім'ядолі за довжиною	середні	5	
2	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
3	Листкова пластинка: пухирчатість	помірна	5	
4	Листкова пластинка: часточковість	відсутня або дуже слабка	1	
5	Черешок: положення	напівпохиле	3	
6	Черешок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: положення	напівпряме	3	
8	Листкова пластинка: форма (за винятком базальних часток)	трикутна	1	
9	Листкова пластинка: вигин краю	плескатий	2	
10	Листкова пластинка: форма верхівки	гостра	1	
11	Листкова пластинка: форма поздовжнього розрізу	плеската	2	
12	Кількісне співвідношення однодомних рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
13	Кількісне співвідношення жіночих рослин	високе	7	
14	Кількісне співвідношення чоловічих рослин	відсутнє або дуже низьке	1	
15	Час початку стрілкування (для сортів весняної сіви, 15% рослин)	ранній	3	
16	Насінина: колючки (стигле насіння)	відсутні	1	
17	Стійкість до <i>Peronospora farinosa</i> f. <i>spinaciae</i>	наявна	9	
18	Стійкість до <i>Cucumber mosaic virus</i> (CMV)	ознака не визначалась	0	
19	Листок: антоціанове забарвлення черешків і жилок	відсутнє	1	
20	Стійкість до <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>spinaciae</i>	ознака не визначалась	0	

**За інформацією наданою заявником:**

**– показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 4. Товарна врожайність, т/га – 3,7. Період від сходів до збирання врожаю, дів – 35. Маса 1000 насінин, г – 10. Вміст у листках: сухої речовини, % – 5; загального цукру, % – 17,5; вітаміну С, мг/100 г с. р. – 20; нітратів, мг/100 г с. р. – 155. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): *Peronospora farinosa* f. sp. *spinaciae* – 8.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП, ЗГр.