

**Вид:** Актинідія пурпурова x актинідія гостра *Actinidia purpurea* Rehd. x *Actinidia arguta* Planch.

**Заявка № 23368001 Назва сорту:** Славна **Заявник (код):** 348 **Власник сорту (код):** 348

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 03.11.2023 **Патент № 230649**

**Дата пріоритету:** 12.04.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 06.11.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 230973**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

| №  | Ознака  | Проявлення                 | Код | Примітка |
|----|---|----------------------------|-----|----------|
| 1  | Рослина: стать  | жіноча                     | 1   |          |
| 2  | Рослина: самоплідність  | відсутня                   | 1   |          |
| 3  | Рослина: за силою росту   | сильна                     | 7   |          |
| 4  | Молодий пагін: щільність ворсинок                                     | дуже нещільні              | 1   |          |
| 5  | Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки                       | відсутнє або дуже слабке   | 1   |          |
| 6  | Стебло: за товщиною   | тонке                      | 1   |          |
| 7  | Стебло: забарвлення пагона з-під сонячного боку                       | зелено-біле                | 1   |          |
| 8  | Стебло: текстура кори   | гладенька                  | 1   |          |
| 9  | Стебло: ворсинки за щільністю   | відсутні або нещільні      | 1   |          |
| 10 | Стебло: розмір сочевичок  | середній                   | 3   |          |
| 11 | Стебло: кількість сочевичок   | велика                     | 7   |          |
| 12 | Стебло: випуклість брунькового виступу                                | середня                    | 3   |          |
| 13 | Стебло: покриття бруньки  | наявне                     | 9   |          |
| 14 | Стебло: розмір отвору в покритті бруньки                              | малий                      | 1   |          |
| 15 | Стебло: листовий рубець   | плаский                    | 1   |          |
| 16 | Стебло: серцевина   | шарувата                   | 2   |          |
| 17 | Листкова пластинка: форма   | яйцеподібна                | 2   |          |
| 18 | Листкова пластинка: відношення довжина / ширина                       | середнє                    | 5   |          |
| 19 | Листкова пластинка: форма верхівки                                    | гострокінцева              | 2   |          |
| 20 | Листкова пластинка: базальні часточки                                 | торкаються                 | 4   |          |
| 21 | Листкова пластинка: кількість війчастих зубців                        | велика                     | 7   |          |
| 22 | Листкова пластинка: волоски на верхньому боці за щільністю            | відсутні або дуже нещільні | 1   |          |
| 23 | Листкова пластинка: волоски на нижньому боці за щільністю             | відсутні або дуже нещільні | 1   |          |
| 24 | Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення верхнього боку | сильна                     | 7   |          |
| 25 | Листкова пластинка: забарвлення нижнього боку                         | помірно зелене             | 3   |          |
| 26 | Листкова пластинка: строкате забарвлення                              | відсутнє                   | 1   |          |
| 27 | Листкова пластинка колір строкатого забарвлення                       | ознака не визначається     | 0   |          |
| 28 | Листок: відношення довжини черешка до довжини пластинки               | мале                       | 3   |          |
| 29 | Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку                       | помірне                    | 5   |          |
| 30 | Суцвіття: тип   | поодинокі квітка           | 1   |          |
| 31 | Суцвіття: кількість квіток  | середня                    | 3   |          |
| 32 | Генеративна брунька: положення першої луски                           | середнє                    | 2   |          |
| 33 | Квітка: кількість чашолистків   | середня                    | 2   |          |
| 34 | Квітка: основне забарвлення чашолистків                               | біле                       | 1   |          |
| 35 | Квітка: волосинки на чашолистках за щільністю                         | відсутні або дуже нещільні | 1   |          |
| 36 | Квітка: діаметр   | середній                   | 5   |          |
| 37 | Квітка: розташування пелюсток   | перекриваються             | 3   |          |
| 38 | Квітка: вигляд з боку   | випукла                    | 3   |          |
| 39 | Квітка: кількість маточок   | мала                       | 1   |          |
| 40 | Квітка: положення маточок   | пряме                      | 1   |          |
| 41 | Пелюстка: забарвлення адаксового боку                                 | зеленувато-біле            | 2   |          |
| 42 | Пелюстка: розподіл забарвлення  | однорідний                 | 2   |          |
| 43 | Пелюстка: вторинне забарвлення верхнього боку                         | відсутнє                   | 1   |          |
| 44 | Пелюстка: розподіл вторинного забарвлення                             | ознака не визначається     | 0   |          |
| 45 | Пиляк: забарвлення  | сіре                       | 3   |          |
| 46 | Плід: маса  | середня                    | 5   |          |
| 47 | Плід: за довжиною   | середній                   | 5   |          |
| 48 | Плід: за шириною  | середній                   | 5   |          |
| 49 | Плід: відношення довжина / ширина                                     | середнє                    | 5   |          |
| 50 | Плід: форма   | округла                    | 4   |          |
| 51 | Плід: форма поперечного перерізу (посередині)                         | округла                    | 1   |          |
| 52 | Плід: маточковий кінець   | округлий                   | 4   |          |
| 53 | Плід: ступінь загостреності   | слабкий                    | 1   |          |
| 54 | Плід: кільце чашечки  | помірно виражене           | 2   |          |
| 55 | Плід: форма плеча базальної частини                                   | зрізана                    | 1   |          |
| 56 | Плід: плодоніжка за довжиною  | середня                    | 5   |          |
| 57 | Плід: довжина плодоніжки відносно довжини плоду                       | довга                      | 7   |          |
| 58 | Плід: прояв сочевичок на шкірці                                       | сильний                    | 3   |          |
| 59 | Плід: ворсистість шкірки  | відсутня                   | 1   |          |
| 60 | Плід: ворсинки за щільністю   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 61 | Плід: забарвлення ворсинок  | ознака не визначається     | 0   |          |
| 62 | Плід: з'єднання ворсинок із шкіркою                                   | ознака не визначається     | 0   |          |
| 63 | Плід: забарвлення шкірки  | зелене                     | 2   |          |
| 64 | Плід: з'єднання шкірки із м'якоттю                                    | помірне                    | 2   |          |
| 65 | Плід: забарвлення зовнішнього оплодня                                 | світло-зелене              | 1   |          |
| 66 | Плід: забарвлення камер   | зеленувато-жовте           | 4   |          |

| №  | Ознака   | Проявлення | Код | Примітка |
|----|--|------------|-----|----------|
| 67 | Плід: поширення червонуватого забарвлення вздовж камер   | сильне     | 4   |          |
| 68 | Плід: інтенсивність червонуватого забарвлення на камерах | слабка     | 3   |          |
| 69 | Плід: відношення ширина серцевини / діаметр плоду        | середнє    | 5   |          |
| 70 | Плід: основна форма серцевини в поперечному перерізі     | сплюснута  | 2   |          |
| 71 | Плід: забарвлення серцевини                              | жовто-біле | 3   |          |
| 72 | Плід: цукристість  | середня    | 5   |          |
| 73 | Плід: кислотність  | середня    | 5   |          |
| 74 | Час розпускання вегетативних бруньок                     | середній   | 5   |          |
| 75 | Час початку цвітіння                                     | середній   | 5   |          |
| 76 | Час збиральної стиглості                                 | середній   | 5   |          |

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Група стиглості: середня – 5. Самоплідність: відсутня – 9. Час збиральної стиглості: середній – 5. Урожайність, т/га – 16,5. Середня маса плоду, г – 11,7. Вміст у плодах: вітаміну С, мг/100 г – 48,5; каротину, мг/100 г – 0,54. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 9. Посухостійкість, бал (1–9) – 9. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): плямистість листків (*Septoria piricola* Desm) – 9; сіра плодова гниль (*Botrytis cinerea* Pers.) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**