

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 21304008 Назва сорту: АРРАСЬОРТИ Заявник (код): 2824 Власник сорту (код): 2824

Дата пріоритету: 18.10.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231141

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	дуже ранній	1	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	нещільна	3	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	жовто-зелене	1	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	нещільна	3	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	дельтоподібна	2	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	сім	4	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	один бік увігнутий, другий – випуклий	4	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	висока	7	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	однакова	3	
31	Час початку достигання ягід	дуже ранній	1	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	дуже великий	9	
33	Гроно: за щільністю	нещільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного грона за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже великий	9	
36	Ягода: форма	циліндрична	5	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	зелене	1	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	відсутнє	1	
44	Здерев'янілий пагін: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

**За інформацією наданою заявником:
– показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 30,2. Середній урожай з куща, кг – 20,1. Середня маса 100 ягід, г – 700,0. Середня маса грона, г – 630,0. Горощіння ягід, % – 0. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, дів – 15,0. Вихід соку, % – 65,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 2,0; кислот у ягодах, г/л – 4,4. Цукристість соку ягід, % – 19,2. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; мілдью – 7; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стиглості, дів – 100. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стиглості – рс. Напрямок використання – стл. Схема садіння – 3,5 x 2,0. Транспортельність, бал (1–9) – 7. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.