

Вид: Виноград справжній *Vitis vinifera* L.

Заявка № 21304005 Назва сорту: АРРАФІФТІН Заявник (код): 2824 Власник сорту (код): 2824

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 06.11.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 230974

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	дуже ранній	1	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	темно-мідно-червоне	5	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
9	Пагін: положення (до пів язування)	горизонтальне	5	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелені і червоні	2	
11	Пагін: забарвлення вентрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення вентрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлах	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	дуже довгі	9	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	великий	7	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	відсутні або дуже мілкі	1	
22	Лише сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	відкрите	1	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	напівлівідкрите	3	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	середні	5	
25	Розвинений листок: відношення довжина / ширина зубця	середні	5	
26	Розвинений листок: форма зубців прямолінійними боками та обома випуклими	поєднання зубців із обома	5	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку достигання ягід	середній	5	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	великий	7	
33	Гроно: за щільністю	нешільне	3	
34	Гроно: ніжка первинного гrona за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	дуже великий	9	
36	Ягода: форма	циліндрична	5	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	жовто-зелене	2	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	помірно легке	2	
39	Ягода: шкірка за товщиною	товста	3	
40	Ягода: антоціанове забарвлення мякоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість мякоті	дуже тверда	3	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення насіння	рудиментарне	2	
44	Здерев'янілі пагіни: основне забарвлення	темно-коричневе	3	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 31,5. Середній урожай з куща, кг – 21,0. Середня маса 100 ягід, г – 1000,0. Середня маса гrona, г – 650,0. Горошиння ягід, % – 5. Розтріскування ягід, % – 0. Лежкість при зберіганні, діб – 60,0. Вихід соку, % – 66,0. Вміст диглікозидів, мг/дм³ – 2,0; кислот у ягодах, г/л – 5,7. Цукристість соку ягід, % – 21,7. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; міldью – 5; оїдіум – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti, діб – 125,0. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3; лози, бал (1–9) – 3. Група стигlosti – сс. Напрям використання – стл. Схема садіння – 3,5 x 2,0. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: С.