

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045035 Назва сорту:** АФК Спрін **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент №** 230982

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231407

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насіннєвої оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,50	3,69	3,44
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,43	0,49	0,44
+, - до усередненої урожайності, %	20,8	15,3	14,7
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	123	127	134
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	176,4	191,2	176,7
Висота рослини, см	77,3	97,5	104
Висота прикріплення нижнього бобу, см	14,7	13,2	14,3
Стійкість до вилягання, бал	9	6	7
Стійкість до обсіпання, бал	5	9	9
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	8	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	9
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	39,3	40,4	36,7
Вміст олії, %	21,7	20,6	22,4
Блок (група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.