

**Вид:** Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

**Заявка № 21045034 Назва сорту:** АФК Темпо **Заявник (код):** 655 **Власник сорту (код):** 655

**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 14.12.2023 **Патент № 230981**

**Дата пріоритету:** 22.12.2021

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 231406**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від середньої до високої	6	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	широкояйцеподібна	4	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	чорне	6	
18	Насінина: забарвлення сім'янтжки рубчика	як у насіннєвій оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

**Результат польових досліджень показників господарської придатності**

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	3,25	3,64	3,63
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,40	0,56	0,69
+, - до усередненої урожайності, %	75,7	18,2	23,5
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	108	115	121
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	200,2	188,5	178,1
Висота рослини, см	65	86,3	84
Висота прикріплення нижнього бобу, см	13,6	14,8	15
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	9	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	8
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	9
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	9
Вміст білка, %	39,2	39,3	37,5
Вміст олії, %	22,5	22,1	23,2
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** СЛП.