

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045014 Назва сорту: ДМ АМБАР **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

Дата пріоритету: 07.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231505

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	індетермінантний	4	
4	Рослина: габітус (характер росту)	прямий	1	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	жовте	2	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінній оболонці	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,89	3,28	3,37
+, - до усередненої урожайності, т/га	1,04	0,20	0,43
+, - до усередненої урожайності, %	56,2	6,5	14,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	110	114	118
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	148,1	170,3	152,1
Висота рослини, см	53,3	70,3	77,6
Висота прикріплення нижнього бобу, см	8,6	8,8	11,6
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	8	8	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	9	9	7
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	9	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	37,3	38	35,5
Вміст олії, %	23,1	22,1	23,8
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напряма використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, вл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.