

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045018 Назва сорту: ДМ ЕАСТІНА **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

Дата пріоритету: 07.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231509

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	напівпрямий	3	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	від низької до середньої	4	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	сильна	7	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	кулясто-плеската	2	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінневі оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	як у насінневі оболонки	1	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,83	3,18	3,29
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,98	0,10	0,35
+, - до усередненої урожайності, %	53,0	3,2	11,9
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, діб	110	116	123
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	182,1	199,1	176,2
Висота рослини, см	66,3	76,5	85,3
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,6	11,2	12,3
Стійкість до вилягання, бал	9	9	8
Стійкість до обсипання, бал	8	9	9
Стійкість до посухи, бал	5	9	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	7	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	9
Вміст білка, %	37,3	40,4	36,8
Вміст олії, %	23,4	21,4	23,5
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.