

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 20045046 Назва сорту: КСЖ 19005 **Заявник (код):** 2653 **Власник сорту (код):** 485

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 17.01.2023 **Патент № 230105**

Дата пріоритету: 03.12.2020

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 21.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231404

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	від напівдетермінантного до індетермінантного	3	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (триїчастого листка)	загостренояйцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	середній	5	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	темно-коричневе	4	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	від раннього до середнього	4	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,21	2,92	3,28
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,36	-0,16	0,34
+, - до усередненої урожайності, %	19,5	-5,2	11,6
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, днів	102	111	117
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	164,8	186,2	166,3
Висота рослини, см	59,6	93,7	99,5
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,5	13,2	14
Стійкість до вилягання, бал	9	8	7
Стійкість до обсіпання, бал	7	8	7
Стійкість до посухи, бал	6	6	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	9	6
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	8	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	9	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	9	9	8
Вміст білка, %	41,4	42,1	40,8
Вміст олії, %	21,4	21	21,6
Блок (Група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, сл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СП.