

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 21045015 Назва сорту: СВХ20Т00С4 Заявник (код): 2061 Власник сорту (код): 2061

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 08.12.2023 Патент № 230890

Дата пріоритету: 02.12.2021

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231317

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	помірна	5	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	біле	1	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	середній	5	
14	Насінина: форма	куляста	1	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насінній оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'яної рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	середній	5	
20	Рослина: час досягання	середній	5	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	2,07	3,20	3,00
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,57	3,47	3,01
+ , - до усередненої урожайності, т/га	0,50	0,27	0,01
+ , - до усередненої урожайності, %	24,2	8,4	0,3
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,07	0,07
Тривалість періоду вегетації, діб	121	122	127
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	196,5	214,6	204,4
Висота рослини, см	65,2	79,3	87,9
Висота прикріплення нижнього бобу, см	10,1	14	13
Стійкість до вилягання, бал	9	8	9
Стійкість до обсипання, бал	8	8	9
Стійкість до посухи, бал	4	9	8
Стійкість проти пероноспорозу, бал	9	9	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	9
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	7	7
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	8
Стійкість проти фузаріозу, бал	7	9	8
Вміст білка, %	40,7	41,5	38,5
Вміст олії, %	22,3	21,6	22,9
Блок (Група стиглості)	7	7	7
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, вл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.