

Вид: Соя культурна *Glycine max* (L.) Merr.

Заявка № 22045015 Назва сорту: ФАНТИНЕ **Заявник (код):** 2863 **Власник сорту (код):** 2863

Дата пріоритету: 07.02.2022

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 29.12.2023

Свідоцтво про державну реєстрацію № 231506

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Гіпокотиль: антоціанове забарвлення	наявне	9	
2	Гіпокотиль: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
3	Рослина: тип росту	детермінантний	1	
4	Рослина: габітус (характер росту)	від прямого до напівпрямого	2	
5	Рослина: забарвлення опушення головного стебла (в середній третині)	рудувато-коричневе	2	
6	Рослина: за висотою	середня	5	
7	Листок: пухирчастість	слабка	3	
8	Листок: форма бічного листочка (трійчастого листка)	загостреноїцеподібна	3	
9	Листок: розмір бічного листочка	великий	7	
10	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Квітка: забарвлення	фіолетове	2	
12	Біб: інтенсивність коричневого забарвлення	помірна	5	
13	Насінина: розмір	великий	7	
14	Насінина: форма	видовжено-плеската	4	
15	Насінина: основне забарвлення оболонки (рубчик не враховують)	жовте	1	
16	Насінина: забарвлення в насіннєвій оболонці, викликане реакцією пероксидази	ознака не визначена	0	
17	Насінина: забарвлення рубчика	світло-коричневе	3	
18	Насінина: забарвлення сім'янки рубчика	інше	2	
19	Рослина: час початку цвітіння (50% рослин щонайменше з однією відкритою квіткою)	ранній	3	
20	Рослина: час досягання	ранній	3	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, т/га	1,85	3,08	2,94
Урожайність (за стандартної вологості), т/га	2,64	3,02	3,12
+, - до усередненої урожайності, т/га	0,79	-0,06	0,18
+, - до усередненої урожайності, %	42,7	-1,9	6,1
Довірчий інтервал, т/га	0,09	0,09	0,09
Тривалість періоду вегетації, дб	106	112	120
Маса 1000 насінин (за стандартної вологості), г	190,8	195,3	185,8
Висота рослини, см	58,8	73,8	78,8
Висота прикріплення нижнього бобу, см	11,3	10,8	11,8
Стійкість до вилягання, бал	9	9	9
Стійкість до обсіпання, бал	7	9	9
Стійкість до посухи, бал	7	8	9
Стійкість проти пероноспорозу, бал	8	8	7
Стійкість проти аскохітозу, бал	8	9	8
Стійкість проти бактеріозу, бал	9	8	8
Стійкість проти септоріозу, бал	8	8	7
Стійкість проти фузаріозу, бал	8	9	8
Вміст білка, %	38,7	39,6	36
Вміст олії, %	22	21,6	23,2
Блок (група стиглості)	6	6	6
Напрямок використання	зерн	зерн	зерн
Якість	сбіл, сл	сбіл, сл	сбіл, вл

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.