

Вид: Огірок посівний *Cucumis sativus L.***Заявка № 22110008 Назва сорту:** ФРОСТ**Заявник (код):** 1852**Власник сорту (код):** 1852**Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності:** 05.12.2023**Патент №** 230826**Дата пріоритету:** 01.12.2022**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 21.12.2023**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 231390**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Сім'ядолі: гіркота	відсутня	1	
2	Рослина: тип росту	індегермінантний	2	
3	Рослина: загальна довжина перших 15 міжузлів	середня	5	
4	Листкова пластина: положення	горизонтальне	2	
5	Листкова пластина: за довжиною	середня	5	
6	Листкова пластина: відношення довжина апікальної лопаті / довжина пластиинки	помірне	5	
7	Листкова пластина: форма апікальної лопаті	заокруглена	4	
8	Листкова пластина: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
9	Листкова пластина: пухирчастість	відсутня або дуже слабка	1	
10	Листок: хвильисттє краю	помірна	2	
11	Листкова пластина: зубчастість краю	помірна	5	
12	Час розвитку жіночих квіток (80% рослин з щонайменше однією жіночою квіткою)	середній	5	
13	Рослина: виявлення статі	гіноєїність	3	
14	Рослина: кількість жіночих квіток на вузлі	ознака не визначалась	0	
15	Зав'язь: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1	
16	Партенокарпія	наявна	9	
17	Плід: за довжиною	середній	5	
18	Плід: діаметр	малий	3	
19	Плід: відношення довжина / діаметр	середнє	5	
20	Плід: відношення діаметра серцевини до діаметра плоду	мале	3	
21	Плід: форма поперечного перерізу	округла	1	
22	Плід: форма основи	тупа	3	
23	Лиші для сортів із шийкою. Плід: шийка за довжиною	ознака не визначається	0	
24	Плід: форма верхівки	округла	3	
25	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі технічної стигlosti	зелене	3	
26	За винятком блоплідних сортів. Плід: інтенсивність основного забарвлення шкірки (як для 25)	сильна	7	
27	Плід: ребристість	відсутня або слабка	1	
28	Плід: борозенки	наявні	9	
29	Плід: зморшкуватість	наявна	9	
30	Плід: ступінь зморшкуватості	дуже слабкий	1	
31	Плід: тип покриву	лише шипики	3	
32	Плід: покрив за щільністю	помірний	5	
33	Лиші сорти з білою зав'яззю (озн. 15). Плід: забарвлення зовнішнього покриву	бліле	1	
34	Плід: горбочки	наявні	9	
35	Плід: розмір горбочків	великий	7	
36	Плід: смужки за довжиною	відсутні або дуже короткі	1	
37	Плід: плями	наявні	9	
38	Плід: характер поширення плям	рівномірно поширені	3	
39	Плід: довжина плям відносно довжини плоду	виключаючи місце навколо плодоніжки	4	
40	Плід: щільність плям	нешільна	3	
41	Плід: наліт	відсутній або дуже слабкий	1	
42	Плід: плодоніжка за довжиною	коротка	3	
43	Плід: основне забарвлення шкірки у фазі фізіологічної стигlosti	жовте	2	
44	Стійкість проти <i>Cladosporium cucumerinum</i> (Ccu).	наявна	9	
45	Стійкість проти звичайної мозайки огірка (<i>Cucumis Mosaic Virus (CMV)</i>)	помірно стійкий	2	
46	Стійкість проти борошнистої роси (<i>Podosphaera xanthii</i>)	помірно стійкий	2	
47	Стійкість проти несправжньої борошнистої роси (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	сприйнятливий	1	
48	Стійкість проти бурої плямистості (<i>Corynespora melonis</i>)	відсутня	1	
49	Стійкість проти вірусу пожовтіння судин огірка (CVYV)	відсутня	1	
50	Стійкість проти вірусу зеленої крапчастої мозайки огірка (<i>Cucumber Green Mottle Mosaic Virus</i>) (CGMMV)	відсутня	1	

За інформацією наданою заявником:**- показники господарської придатності**

Загальна врожайність, т/га – 8. Вміст сухої речовини в плоді, % – 3. Тривалість періоду від повних сходів до початку споживчої стигlosti, діб – 52. Тривалість періоду плодоношення, діб – 135.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.