

Вид: Картопля *Solanum tuberosum* L.**Заявка № 15088012 Назва сорту:** Базалія **Заявник (код):** 1710 **Власник сорту (код):** 1710**Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення:** 21.02.2019**Свідоцтво про державну реєстрацію № 190712****Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Світловий паросток: розмір	середній	5	
2	Світловий паросток: форма	яйцеподібна	2	
3	Світловий паросток: інтенсивність антоціанового забарвлення основи	помірна	5	
4	Світловий паросток: співвідношення блакитного в антоціановому забарвленні основи	відсутнє або дуже мале	1	
5	Світловий паросток: опушення основи	помірне	5	
6	Світловий паросток: розмір верхівки порівняно з основою	велика	7	
7	Світловий паросток: форма верхівки	закрита	1	
8	Світловий паросток: антоціанове забарвлення верхівки	помірне	5	
9	Світловий паросток: опушення верхівки	помірне	5	
10	Світловий паросток: кількість кореневих кінчиків	мало	3	
11	Світловий паросток: бічні пагони за довжиною	короткі	3	
12	Рослина: тип розвитку	листковий	3	
13	Рослина: габітус	розлогий	7	
14	Стебло: антоціанове забарвлення	слабке	3	
15	Листок: загальний розмір	середній	5	
16	Листок: за відкритістю	відкритий	5	
17	Листок: виявлення вторинних листочків	помірне	5	
18	Листок: зелене забарвлення	помірне	5	
19	Листок: поширення антоціанового забарвлення жилок на верхньому боці	відсутнє або дуже слабке	1	
20	Друга пара бічних листочків: розмір	середній	5	
21	Друга пара бічних листочків: за ширину	середні	5	
22	Верхівкові і бічні листочки: частота зрошення	рідко	3	
23	Листочек: хвильистість краю	слабка	3	
24	Листочек: заглиблення жилок	середнє	5	
25	Листочек: глянсуватість верхнього боку	помірно глянсуватий	5	
26	Листочек: опушення пластинки на верхівці розетки	наявне	9	
27	Бутон: антоціанове забарвлення	середнє	5	
28	Рослина: за висотою	середня	5	
29	Рослина: рясність цвітіння	помірне	5	
30	Суцвіття: розмір	середній	5	
31	Суцвіття: антоціанове забарвлення квітконіжки	помірне	5	
32	Віночок квітки: розмір	середній	5	
33	Віночок квітки: інтенсивність антоціанового забарвлення внутрішнього боку	помірна	5	
34	Віночок квітки: співвідношення блакитного у антоціановому забарвленні внутрішнього боку	середнє	2	
35	Віночок: поширення антоціанового забарвлення на внутрішньому боці	середнє	5	
36	Рослина: час достигання	ранній	3	
37	Бульба: форма	короткоовальна	2	
38	Бульба: вічка за глибиною	середні	5	
39	Бульба: забарвлення шкірки	червоне	3	
40	Бульба: забарвлення основи вічка	червоне	3	
41	Бульба: забарвлення м'якоті	кремове	2	
42	Лише сорти із світло-бежевою і жовтою шкіркою: Бульба: антоціанове забарвлення шкірки під впливом світла	ознака не визначається	0	

Результат польових досліджень показників господарської придатності

Показник	Значення		
	С	Л	П
Усереднена урожайність сортів, що пройшли державну реєстрацію за п'ять попередніх років, ц/га	160,3	162,7	
Довірчий інтервал, ц/га (±)	27,0	13,3	
Урожайність, ц/га	275,7	254,0	
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, ц/га	115,4	91,3	
+ - до усередненого значення урожайності за 5 попередніх років, %	72	56	
Вміст крохмалю, %	13,9	12,2	
Збір крохмалю, ц/га	38,3	30,9	
Вміст сухої речовини, %	21,0	19,7	
Тривалість періоду вегетації, діб	95	95	
Середня маса товарної бульби, г	130,4	95,3	
Товарність бульб, %	77,4	68,9	
Лежкість, бал	5	5	
Дегустаційна оцінка, бал	9	7	
Стійкість до звичайного патотипу збудника раку	Стійкий	Стійкий	
Стійкість проти макроспоріозу, бал	9	9	
Стійкість проти фітофорозу, бал	9	9	
Напрям використання	СТЛ	СТЛ	
Якість	СКР	НКР	

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.