

Вид: Салат посівний ромен *Lactuca sativa* L. var. *longifolia*

Заявка № 17546003 Назва сорту: Тацитус **Заявник (код):** 1730 **Власник сорту (код):** 1730

Дата державної реєстрації майнового права інтелектуальної власності на поширення: 13.11.2018

Свідоцтво про державну реєстрацію № 180980

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Насінина: забарвлення	чорне	3	
2	Сіянець: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
3	Сіянець: сім'ядолі за розміром (за повного розвитку)	ознака не визначалась	0	
4	Сіянець: форма сім'ядолей	ознака не визначалась	0	
5	Листок: положення у стадії 10-12 листків	пряме	1	
6	Листкова пластинка: за розсіченістю краю	нерозсічена	1	
7	Рослина: діаметр	великий	7	
8	Рослина: утворення головки	закрита головка	3	
9	Тільки сорти із закритою головкою. Головка: перекриття верхньої частини листків	слабке	3	
10	Головка: за щільністю	щільна	7	
11	Головка: розмір	середній	5	
12	Лише для сортів маслянистогоголовчастого типу у теплицях. Головка: закриття основи	ознака не визначалась	0	
13	Головка: форма поздовжнього розрізу	вузькоеліптична	1	
14	Листок: за товщиною	товстий	7	
15	Листок: положення за збиральною стиглості (зовнішні листки у головчастого салату або сформовані листки для листкового і стеблового салатів)	пряме	1	
16	Листок: форма	оберненояцеподібна	7	
17	Листок: форма верхівки	округла	3	
18	Листок: відтінок зеленого забарвлення зовнішніх листків	відсутній	1	
19	Листок: інтенсивність забарвлення зовнішніх листків	помірне	5	
20	Листок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
21	Листок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
22	Листок: поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
23	Листок: тип поширення антоціанового забарвлення	ознака не визначалась	0	
24	Листок: глянуватість з верхнього боку	слабка	3	
25	Листок: пухирчастість	помірна	5	
26	Листок: розмір пухирів	малий	3	
27	Листкова пластинка: хвилястість краю	слабка	3	
28	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки	відсутня	1	
29	Листкова пластинка: розсіченість краю верхівки за глибиною	ознака не визначалась	0	
30	Листкова пластинка: ступінь розсіченості краю верхівки	ознака не визначалась	0	
31	Тільки сорти з мілкою розсіченістю краю верхівки. Листкова пластинка: тип розсіченості	ознака не визначалась	0	
32	Листкова пластинка: жилкування	невіялоподібне	1	
33	Пазушне жилкування	слабке	3	
34	Час збиральної стиглості	дуже пізній	9	
35	Час початку з'явлення квітконоса в умовах довгого дня	дуже пізній	9	
36	Рослина: за висотою (квітуча рослина)	ознака не визначалась	0	
37	Рослина: фасціація (під час цвітіння)	наявна	9	
38	Стебло: інтенсивність фасціації (під час цвітіння)	слабка	3	
39	Стійкість до борошнистої роси (<i>Bremia lactucae</i>) I isolate B1:16	наявна	9	
40	Стійкість проти вірусу мозаїки салату (LMV) Патотип Ls 1	наявна	9	
41	Стійкість проти попелиць (види <i>Aphis gossypii</i> , <i>A. fabae</i> , <i>Myzodes persicae</i>)	ознака не визначалась	0	
42	Стійкість проти <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lactucae</i>	ознака не визначалась	0	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 35. Середня маса плоду, г – 400. Щільність головки, балів – 7. Тривалість періоду до досягання, діб – 52. Лежкість, % – 8. Ураження хворобами: несправжньою борошнистою росю, % – 7, борошнистою росю, % – 8, антракнозом, % – 7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: СЛП.