

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 23118003 Назва сорту: Ніжна **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Дата пріоритету: 01.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 14.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240119

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
3	Сім`ядолі: розмір	великий	7	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	горизонтальне	5	
6	Листок: за довжиною	довгий	7	
7	Листкова пластинка: форма	оберненояцеподібна	3	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	округла	2	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	середня	5	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	наявні	9	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	неглибокі	3	
14	Листкова пластинка: опушення	помірне	5	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	наявне	9	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	слабка	3	
17	Коренеплід: діаметр	великий	7	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	вузький	3	
19	Коренеплід: форма	еліптична	3	
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3	
21	Коренеплід: форма основи	тупа	3	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	темно рожево-червоне	6	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	багряне	2	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час досягання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дупла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	короткий	3	
31	Коренеплід: форма плеча	тупа	3	

За інформацією наданою заявником:

– показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 39. Тривалість періоду до досягання, діб – 30. Середня маса плоду, г – 20. Вміст сухої речовини, % – 4; вітаміну С, мг/100 г – 24. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 6; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 6; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 6.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.