

**Вид:** Горіх грецький *Juglans regia* L.

**Заявка № 23284002 Назва сорту:** Парамонівський **Заявник (код):** 3237 **Власник сорту (код):** 3237

**Дата пріоритету:** 06.12.2023

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.02.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240094

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: за силою росту	сильне	7	
2	Дерево: габітус	прямий	1	
3	Дерево: щільність розміщення гілок	нещільна	3	
4	Дерево: переважаюче розташування генеративних бруньок (плодоношення по периферії дерева)	на верхівці однорічного пагона	1	
5	Однорічний пагін: забарвлення	чорнувате	4	
6	Листок: форма бічних листочків	еліптична	5	
7	Квітка: кількість чоловічих суцвіть	середня	5	
8	Горіх: розмір	великий	7	
9	Горіх: форма у поздовжньому розрізі (через шов)	округла	1	
10	Горіх: форма в поздовжньому розрізі перпендикулярно до шва	широкояйцеподібна	3	
11	Горіх: форма у поперечному перерізі	еліптична	3	
12	Горіх: коефіцієнт округлості	високий	7	
13	Горіх: форма основи перпендикулярно до шва	округла	2	
14	Горіх: форма верхівки (як для 13)	округла	2	
15	Горіх: виступ апікального кінчика	середній	5	
16	Горіх: положення «сідельця» на шві	у верхній половині	1	
17	Горіх: помітність «сідельця» на шві	помірна	5	
18	Горіх: «сідельце» на шві за шириною	широке	7	
19	Горіх: боріздка вздовж «сідельця» на шві за глибиною	середня	5	
20	Горіх: структура поверхні шкаралупи	рельєфна	4	
21	Горіх: шкаралупа за товщиною	середня	5	
22	Горіх: міцність з'єднання двох половинок шкаралупи	сильна	7	
23	Горіх: первинна і вторинна роз'єднуючі перетинки за товщиною	середні	5	
24	Ядро: легкість видалення зі шкаралупи	помірно	5	
25	Ядро: за інтенсивністю основного забарвлення	помірна	5	
26	Ядро: розмір	великий	7	
27	Ядро: відсоткове відношення до загальної маси горіха	середнє	5	
28	Час досягання	від середнього до пізнього	6	
29	Час початку листопаду	середній	5	
30	Листок: стійкість до опадання	стійкий	2	
31	Оплодень: стійкість до опадання	частково стійкий	2	
32	Час розпускання вегетативних бруньок	середній	5	
33	Час цвітіння чоловічих квіток	від дуже раннього до раннього	2	
34	Час цвітіння жіночих квіток	від дуже раннього до раннього	2	
35	Час цвітіння чоловічих квіток порівняно із жіночими	одночасно (гомогамний)	2	

**За інформацією наданою заявником:  
- показники господарської придатності**

Середня врожайність, т/га – 3,0. Середній урожай з дерева, кг – 30,0. Середня маса плоду, г – 18,0. Зимостійкість, бал (1–9) – 7. Посухостійкість, бал (1–9) – 6. Настання знімальної стиглості, діб – 135. Виповненість горіха, бал (1–9) – 8. Твердість шкаралупи, бал (1–9) – 4. Вихід ядра, % – 50,0. Легкість видалення ядра, бал (1–9) – 9. Вміст жиру, % – 65,0; білка, % – 15,0; вуглеводів, % – 7,0. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): горіхова попелиця – 7; горіхова міль – 6. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): бура плямистість – 6; чорна плямистість – 7. Група досягання – сп.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** Л.