

**Вид:** Слива домашня *Prunus domestica* L.

**Заявка № 18261001 Назва сорту:** Віраж **Заявник (код):** 2314 **Власник сорту (код):** 2314

**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 28.02.2024

**Свідоцтво про державну реєстрацію № 240150**

**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Дерево: сила росту	середня	5	
2	Дерево: щільність крони	помірна	5	
3	Однорічний пагін: положення	напівпряме	3	
4	Однорічний пагін: за товщиною	середній	5	
5	Однорічний пагін: міжвузля за довжиною	середні	5	
6	Однорічний пагін: опушення (верхня третина)	слабке	3	
7	Однорічний пагін: кількість сочевичок	мала	3	
8	Однорічний пагін: розмір вегетативної бруньки	малий	3	
9	Однорічний пагін: форма вегетативної бруньки	загострена	1	
10	Однорічний пагін: положення вегетативної бруньки відносно пагона	помітно відхилене	3	
11	Однорічний пагін: розмір підбрунькового виступу	великий	7	
12	Однорічний пагін: опора підбрунькового виступу	наявна	9	
13	Молодий пагін: антоціанове забарвлення верхівки (впродовж інтенсивного росту)	середнє	5	
14	Листкова пластинка: положення по відношенню до пагона	спрямоване назовні	2	
15	Листкова пластинка: за довжиною	середня	5	
16	Листкова пластинка: за шириною	широка	7	
17	Листкова пластинка: відношення довжина /ширина	велике	7	
18	Листкова пластинка: форма	еліптична	2	
19	Листкова пластинка: кут верхівки (за виключенням кінчика)	прямий	2	
20	Листкова пластинка: форма основи	тупа	2	
21	Листкова пластинка: зелене забарвлення верхнього боку	помірне	5	
22	Листкова пластинка: глянуватість верхнього боку	помірна	5	
23	Листкова пластинка: опушення нижнього боку	відсутнє	1	
24	Листкова пластинка: форма краю	городчаста	1	
25	Черешок: за довжиною	середній	5	
26	Черешок: опушення нижнього боку	слабке	3	
27	Листок: відношення довжини листкової пластинки до довжини черешка	середнє	5	
28	Листок: нектарники	відсутні	1	
29	Листок: розміщення нектарників	ознака не визначається	0	
30	Квітучий пагін: кількість квіток	середня	5	
31	Квітка: діаметр (повністю відкриті квітки)	середній	5	
32	Квітконіжка: за довжиною	довга	7	
33	Квітконіжка: опушення	відсутнє	1	
34	Чашечка: положення чашолистків	не торкаються ні пелюсток, ні квітколожа	2	
35	Чашолисток: форма	вузькоеліптична	1	
36	Квітка: розташування пелюсток	дотичне	2	
37	Пелюстка: розмір	середній	5	
38	Пелюстка: форма	оберненойцеподібна	4	
39	Пелюстка: хвилястість краю	відсутня	1	
40	Приймочка маточки: розміщення відносно пиляків	на одному рівні	2	
41	Пиляк: забарвлення (перед розтріскуванням)	жовтувате	1	
42	Зав'язь: опушення	відсутнє	1	
43	Плід: розмір	великий	7	
44	Плід: форма (вигляд збоку)	округла	3	
45	Плід: симетричність (вигляд збоку)	симетричний	1	
46	Плід: шов у напрямку до кінця плодоніжки за глибиною	середній	5	
47	Плід: заглиблення верхівки	відсутнє або слабке	1	
48	Плід: опушення верхівки	відсутнє	1	
49	Плід: заглиблення плодоніжки	мілке	3	
50	Плід: основне забарвлення шкірочки (після видалення воскового нальоту)	фіолетово-синє	10	
51	Плід: забарвлення м'якоті	жовте	4	
52	Плід: твердість м'якоті	тверда	7	
53	Плід: соковитість	середня	5	
54	Плід: ступінь зростання кісточки з м'якоттю	не зрощені	1	
55	Кісточка: основна форма (вигляд збоку)	еліптична	2	
56	Кісточка: форма з черевного боку	еліптична	2	
57	Кісточка: розвиток кіля	середній	5	
58	Кісточка: структура бічної поверхні	зерниста	1	
59	Кісточка: основа за шириною	середня	5	
60	Кісточка: форма верхівки	загострена	1	
61	Час початку цвітіння	середній	5	
62	Час початку достигання плодів	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Сила росту: 5 – середня. Група стиглості: 5 – середня. Урожайність, т/га – 17,8. Середній урожай з дерева, кг – 42,8. Середня маса плоду, г – 40,6. Середня маса кісточка, г – 1,6. Відокремлення кісточка від м'якоти: 5 – відокремлюється. Вміст в плодах загального цукру, % – 9,04; аскорбінової кислоти, мг/100 г – 4,83. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 8. Зимостійкість, бал (1–9) – 8. Посухостійкість, бал (1–9) – 7. Стійкість проти ураження хворобами, бал (1–9): моніліоз (*Monilia cinerea* Bonord.) – 7; червона плямистість (полістігмоз) (*Polystigmia rubra* Sacc.) – 5; іржа (*Tranzschelia pruni-spinosae* (Pers.) Diet.) – 7. Стійкість проти пошкодження (заселення) шкідниками, бал (1–9): сливова плодожерка (*Laspeyresia (Grapholifha) fune-brana* Tr.) – 5.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЛП.**