

Вид: Смородина чорна *Ribes nigrum* L.

Заявка № 18297001 Назва сорту: Знахідка **Заявник (код):** 2314 **Власник сорту (код):** 2314

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 28.02.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240151

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Рослина: за висотою	середня	5	
2	Рослина: габітус	напіврозлогий	2	
3	Рослина: кількість базальних пагонів	середня	5	
4	Однорічний пагін: забарвлення	жовто-коричневе	1	
5	Вегетативна брунька: положення відносно пагона	помірно відхилене	2	
6	Вегетативна брунька: за довжиною	середня	5	
7	Вегетативна брунька: форма верхівки	вузькозагострена	1	
8	Вегетативна брунька: антоціанове забарвлення	слабке	3	
9	Вегетативна брунька: наліт	слабкий	3	
10	Молодий пагін: антоціанове забарвлення	помірне	5	
11	Листкова пластинка: за довжиною	довга	7	
12	Листкова пластинка: за шириною	середня	5	
13	Листкова пластинка: відношення довжина / ширина	середнє	5	
14	Листкова пластинка: основа	помірно відкрита	2	
15	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення (верхній бік)	середня	5	
16	Листкова пластинка: глянуватість (верхній бік)	помірна	2	
17	Черешок: антоціанове забарвлення верхнього боку	відсутнє або дуже слабке	1	
18	Рослина: кількість суцвіть на верхівку	одне або два	1	
19	Суцвіття: за довжиною	середнє	2	
20	Суцвіття: кількість квіток	середня	5	
21	Пелюстка: антоціанове забарвлення	помірне	5	
22	Зав'язь: антоціанове забарвлення	помірне	5	
23	Суцвіття: тип	волоть 1	3	
24	Суцвіття: коливання у розмірах ягід	мале	1	
25	Плід: розмір	дуже великий	9	
26	Плід: забарвлення	чорне	3	
27	Плід: глянуватість	дуже слабка	1	
28	Час початку розпускання вегетативної бруньки	середній	5	
29	Час початку цвітіння	середній	5	
30	Час початку збирання плодів	середній	5	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Урожайність, т/га – 18,0. Середній урожай з куца, кг – 5,4. Середня маса ягоди, г – 1,8. Вміст вітаміну С, мг/100 г – 171,0; загального цукру, % – 6,7; пектинових речовин, % – 1,7; сухих розчинних речовин, % – 17,0. Загальна кислотність, % – 2,1. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): антракноз – 9; біла плямистість – 9; борошниста роса – 9; іржа – 9. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): кліщ смородиновий – 9; попелиця – 7; склівка – 7. Підмерзання бруньок, бал (1–9) – 1. Зимостійкість, балів (1–9) – 9. Стійкість до посухи, балів (1–9) – 9. Група стиглості – сс. Напрямок використання – ун. Схема садіння, м – 3,0 x 1,0. Дегустаційна оцінка, балів (1–9) – 8,7.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: Л.