

**Вид:** Виноград справжній *Vitis vinifera* L.**Заявка №** 21304006 **Назва сорту:** АПРАНАЙНТІН **Заявник (код):** 2824 **Власник сорту (код):** 2824**Дата пріоритету:** 13.10.2021**Дата державної реєстрації майнового права на поширення:** 02.02.2024**Свідоцтво про державну реєстрацію №** 240093**Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту**

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Час розпускання бруньок	середній	5	
2	Молодий пагін: відкритість верхівки	широко відкрита	4	
3	Молодий пагін: щільність прилеглих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
4	Молодий пагін: антоціанове забарвлення прилеглих волосків на верхівці	відсутнє або дуже слабке	1	
5	Молодий пагін: щільність прямих волосків на верхівці	відсутні або дуже нещільна	1	
6	Молодий листок: забарвлення верхнього боку пластинки	темно-мідно-червоне	5	
7	Молодий листок: щільність прилеглих волосків між жилками на нижньому боці пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
8	Молодий листок: щільність прямих волосків на жилках із нижнього боку	відсутні або дуже нещільна пластинки	1	
9	Пагін: положення (до підв'язування)	напіввертикальне	3	
10	Пагін: забарвлення дорсального боку міжвузлів	зелене і червоне	2	
11	Пагін: забарвлення центрального боку міжвузлів	зелене	1	
12	Пагін: забарвлення дорсального боку вузлів	зелене і червоне	2	
13	Пагін: забарвлення центрального боку вузлів	зелене	1	
14	Пагін: щільність прямих волосків на міжвузлях	відсутні або дуже нещільна	1	
15	Пагін: вусики за довжиною	довгі	7	
16	Квітка: статеві органи	добре розвинені тичинки і добре розвинена маточка	3	
17	Розвинений листок: розмір пластинки	середній	5	
18	Розвинений листок: форма пластинки	п'ятикутна	3	
19	Розвинений листок: пухирчастість верхнього боку пластинки	відсутня або дуже слабка	1	
20	Розвинений листок: кількість лопатей	п'ять	3	
21	Розвинений листок: верхні бічні вирізи за глибиною	середні	5	
22	Лиші сорти з лопатевими листками. Розвинений листок: розташування лопатей верхніх листкових вирізів	слабко перекриваються	3	
23	Розвинений листок: розташування лопатей біля черешка	широко відкрите	2	
24	Розвинений листок: зубці за довжиною	довгі	7	
25	Розвинений листок: відношення довжина / широта зубця	середнє	5	
26	Розвинений листок: форма зубців	поєднання зубців із обома прямолінійними боками та обома випуклими	5	
27	Розвинений листок: частка головних жилок на верхньому боці листка з антоціановим забарвленням	відсутня або дуже низька	1	
28	Розвинений листок: щільність прилеглих волосків між головними жилками з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
29	Розвинений листок: щільність прямих волосків на головних жилках з нижнього боку пластинки	відсутні або дуже нещільна	1	
30	Розвинений листок: довжина черешка порівняно із довжиною головної жилки	коротша	2	
31	Час початку достигання ягід	дуже ранній	1	
32	Гроно: розмір (без ніжки)	середній	5	
33	Гроно: за щільністю	середнє	5	
34	Гроно: ніжка первинного гrona за довжиною	середня	5	
35	Ягода: розмір	великий	7	
36	Ягода: форма	широкоеліптична	3	
37	Ягода: забарвлення шкірки (без воскового нальоту)	червоне	6	
38	Ягода: відокремлювання від плодоніжки	важке	1	
39	Ягода: шкірка за товщиною	середня	2	
40	Ягода: антоціанове забарвлення м'якоті	відсутнє або дуже слабке	1	
41	Ягода: твердість м'якоті	дуже тверда	3	
42	Ягода: особливий аромат	відсутній	1	
43	Ягода: утворення настіння	рудиментарне	2	
44	Здерев'янілій пагін: основне забарвлення	жовтувато-коричневе	1	

**За інформацією наданою заявником:****- показники господарської придатності**

Урожайність, т/га – 27,0. Середній урожай з куща, кг – 18,0. Середня маса 100 ягід, г – 700,0. Середня маса гrona, г – 600,0. Горошиння ягід, % – 0. Розтріскування ягід, % – 5,0. Лежкість при зберіганні, діб – 60. Вихід соку, % – 70,0. Вміст диглікозидів, мг/дм<sup>3</sup> – 0,57; кислот у ягодах, г/л – 3,4. Цукристість соку ягід, % – 21,9. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): сіра гниль – 5; міldью – 5; oїdium – 5. Стійкість проти шкідників, бал (1–9): листокрутка – 5; філоксера – 5. Період від початку розпускання бруньок до споживчої (технічної) стигlosti, діб – 120. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 5. Рівень підмерзання бруньок, бал (1–9) – 3. Рівень підмерзання лози, бал (1–9) – 3. Група стигlosti – др. Напрям використання – стл. Схема садіння – 3,5 x 2,0. Транспортабельність, бал (1–9) – 9. Дегустаційна оцінка, бал (1–9) – 9.

**Географічні та зонові рекомендації використання сорту:** С.