

Вид: Кріп пахучий *Anethum graveolens* L.

Заявка № 23125002 Назва сорту: Зелена Долина **Заявник (код):** 3236 **Власник сорту (код):** 3236

Дата державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності: 15.03.2024 **Патент № 240144**

Дата пріоритету: 01.12.2023

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 18.03.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240192

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Молода рослина: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
2	Молода рослина: положення листків (стадія 3–5 листків)	пряме	1	
3	Рослина: щільність листків	помірно щільна	5	
4	Рослина: кількість первинних гілочок	велика	7	
5	Рослина: за висотою	середня	5	
6	Стебло: головне стебло за довжиною	середнє	5	
7	Стебло: діаметр (в середній третині)	великий	7	
8	Стебло: блакитний відтінок	наявний	9	
9	Стебло: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
10	Стебло: восковий наліт	дуже сильний	9	
11	Листок: форма	трикутна	1	
12	Листок: частки за щільністю	помірно щільні	5	
13	Листок: кінцеві частки за шириною	вузькі	3	
14	Листок: за довжиною	середній	5	
15	Листок: за шириною	середній	5	
16	Листок: блакитний відтінок	наявний	9	
17	Листок: інтенсивність зеленого забарвлення	сильна	7	
18	Листок: восковий наліт	сильний	7	
19	Головний зонтик: діаметр	середній	5	
20	Головний зонтик: кількість променів	середня	5	
21	Час появи головного зонтика	середній	5	
22	Час початку цвітіння	середній	5	

**За інформацією наданою заявником:
- показники господарської придатності**

Урожайність надземної маси, т/га – 3,1; насіння, т/га – 0,9. Маса 1000 насінин, г – 1,2. Тривалість періоду вегетації, діб – 45. Стійкість до посухи, бал (1–9) – 7. Вміст в насінні ефірної олії, % – 6. Вміст в зеленій масі вітаміну С, мг/100 г – 95. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): несправжня борошниста роса (*Plasmopara nivea* Schrot) – 5. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): септоріоз (*Puccinia petroselini* (DC.) Lindr.) – 5; бактеріальна плямистість (*Bacillus petroselini* Desm.) – 3.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: 3Гр.