

Вид: Редька посівна (редиска) *Raphanus sativus* L. var. *sativus* Pers.

Заявка № 23118002 Назва сорту: Пепіто **Заявник (код):** 2086 **Власник сорту (код):** 2086

Дата державної реєстрації майнового права на поширення: 03.04.2024

Свідоцтво про державну реєстрацію № 240231

Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту

№	Ознака	Проявлення	Код	Примітка
1	Плоїдність	диплоїд	2	
2	Паросток: антоціанове забарвлення гіпокотила	відсутнє	1	
3	Сім'ядолі: розмір	малий	3	
4	Листкова розетка: за шириною основи	середня	5	
5	Листок: положення у просторі	напівпряме	3	
6	Листок: за довжиною	середній	5	
7	Листкова пластинка: форма	вузькооберненойцеподібна	1	
8	Листкова пластинка: форма верхівки	загострена	1	
9	Листкова пластинка: відтінок зеленого забарвлення	відсутній	1	
10	Листкова пластинка: інтенсивність зеленого забарвлення	помірна	5	
11	Листкова пластинка: кількість лопатей	мала	3	
12	Листкова пластинка: надрізи краю	відсутні	1	
13	Листкова пластинка: надрізи краю за глибиною	ознака не визначалась	0	
14	Листкова пластинка: опушення	слабке	3	
15	Черешок: антоціанове забарвлення	відсутнє	1	
16	Черешок: інтенсивність антоціанового забарвлення	ознака не визначається	0	
17	Коренеплід: діаметр	ознака не визначалась	0	
18	Коренеплід: головний корінь за шириною	середній	5	
19	Коренеплід: форма	округла	2	
20	Коренеплід: форма верхівки	випукла	3	
21	Коренеплід: форма основи	округла	4	
22	Коренеплід: забарвлення шкірки	однокольорове	1	
23	Коренеплід: забарвлення верхньої частини	червоне	3	
24	Коренеплід: характер виявлення червоного забарвлення у верхній частині	яскраво-червоне (забарвлення кіноварі)	1	
25	Лише для двокольорових сортів. Коренеплід: розмір білої верхівки	ознака не визначається	0	
26	Коренеплід: кора за товщиною	тонка	3	
27	Коренеплід: основне забарвлення м'якоті	матове біле	2	
28	Час достигання	ранній	3	
29	Коренеплід: здатність до утворення дулла	відсутня або дуже слабка	1	
30	Коренеплід: за довжиною	кородкий	3	
31	Коренеплід: форма плеча	округла	2	

За інформацією наданою заявником:

- показники господарської придатності

Товарна врожайність, т/га – 25. Тривалість періоду до достигання, днів – 42. Середня маса плоду, г – 15. Вміст сухої речовини, % – 4,1; вітаміну С, мг/100 г – 20. Стійкість проти збудників хвороб, бал (1–9): гниль біла (*Sclerotinia Libertiana* Fuck.) – 8; гниль мокра (*Erwinia carotovora* (Jon.) Hell. та *Erwinia aroidea* (Town.) Holl.) – 8; чорна ніжка (*Pythium de Baryanum* Hesse; *Rhizoctonia Aderholdii* (Ruhl.) Kolosch.) – 8.

Географічні та зонові рекомендації використання сорту: ЗГр.